



TOP TRADE PLYUS



Жахон стандартлари асосида ишлаб чиқарилган
ветеринария дори воситалари

КАТАЛОГИ





ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ХАР БИР БОСҚИЧИ
«ISO» ва «GMP»
ТОМОНИДАН СЕРТИФИКАТЛАНГАН.

ВЕТЕРИНАРИЯ ФАРМАЦЕВТИКАСИНИНГ
ЭНГ ЯХШИ ЖАҲОН ЮТУҚЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАЙМИЗ





ПАРАЗИТЛАРГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Альбендазол 10% суспензия	•	•	•				•	4
Альбендазол 2,5% суспензия	•	•	•				•	4
Албен-Праз суспензия	•		•				•	5
Ивер-Праз суспензия	•		•				•	6
Альбендазол Болюс 600 мг	•		•				•	7
Альбендазол Болюс 2 500 мг	•		•				•	8
Альбендазол Гранула 20%	•		•	•	•	•	•	9
Албенокси 900 болюс	•		•			•	•	10
Леваокси 900 болюс	•		•	•	•	•	•	11
Диминазин Б12 витамини билан	•		•	•				12
Бупарвакон 5%	•	•	•	•				13
Клозантель 5%	•		•					14
Ивермектин 1%	•	•	•	•	•		•	15
Ивермектин гель		•						16
Ивермектин плюс	•		•					17
Энджат 25 супсензия	•		•				•	18



АНТИБАКТЕРИАЛ ВА ЯЛЛИГЛАНИШГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Тилозин 99,8% (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	19
Окситетрациклин 99.8% (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	20
Докситил ДТ (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	21
Энрофлокс 10%	•		•	•	•	•	•	22
Энрокол OR (Энрофлоксацин + Колистин)	•		•	•	•	•	•	23
Флорфеникол OR						•		24
Пневмомиг OR (тилмикозин)	•					•		25
Оксифуровит (антибиотик + витамин + минерал)	•	•	•	•	•	•	•	26
Оксинеовит (антибиотик + витамин + минерал)	•	•	•	•	•	•	•	27
Ампивит (антибиотик+витамин+минерал)	•	•	•	•	•	•	•	28
Тилозин 5%	•	•	•	•	•	•	•	29
Тилозин 20%	•	•	•	•	•		•	30
Окситетрациклин 20%	•	•	•	•	•		•	31
Энрофлоксацин 10% инъекция	•		•					32
Цефтиофул инъекцияси	•							33
Доксижента (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	34
Тиложат (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	35
Монтамокс (W.S.P)						•		36
Флоржат						•		37
Скоур стоп (диареяга қарши восита)	•	•	•	•	•		•	38
Пенстреп V	•	•	•	•	•		•	39



АКУШЕРЛИК-ГИНЕКОЛОГИК ВОСИТАЛАР

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Монтацин (Окситацин)	•						•	40
Эстрадиол бензоат	•		•	•	•		•	41

A^B
C^D

ВИТАМИН-МИНЕРАЛ ВОСИТАЛАР

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Виталайт (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	42
Виталайт OR	•	•	•	•	•	•	•	43
Витабест (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	44
Декстриферрон (Темир)	•		•	•	•		•	45
Мультивит инъекцияси	•	•	•	•	•	•	•	46
Витаминлаштирилган Балиқ ёғи	•	•	•	•	•	•	•	47
Витамин Д3	•	•	•	•	•	•	•	48
Бутофосфан OR	•	•	•	•	•	•	•	49
Бутофосфан инъекция	•	•	•	•	•		•	50
Еселенит OR	•	•	•	•	•	•	•	51
Еселенит инъекция	•	•	•	•	•		•	52
Монта 3	•	•	•	•	•	•	•	53
Монвит L	•	•	•	•	•	•	•	54
Монвит P (W.S.P)	•	•	•	•	•	•	•	55
Виталин (injection)	•	•	•	•	•	•	•	56



БОШҚА ФАРМ-ГУРУҲЛАР ВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОСИТАЛАРИ

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Анальгин 30%	•	•	•	•	•		•	57
Неоспрей (Окисспрей)	•	•	•	•	•		•	58
Йодижат (Септо спрей)	•	•	•	•	•		•	59
Комбат	•	•	•			•	•	60
Цитринвет	•	•	•	•	•		•	62
Цитрин 10%	•	•	•	•	•	•	•	63
Диазин 600 (Диазином 60%)	•		•				•	64
Ям малхами (Мазь Ям)	•	•		•	•		•	65
Ихтиол малхами (мазь Ихтиоловая)	•	•	•	•	•		•	66
Ихтиол 99,8%	•	•	•	•	•	•	•	67
Пропоксур								68
Афлабонд	•	•	•			•	•	69



КОКЦИДИОЗГА ҚАРШИ ВОСИТАЛАР

								Бет
	ЙШХ	Отлар	МШХ	Итлар	Мушуклар	Қ/х паррандаси	Бошқалар	
Пулвиз ампролиум (W.S.P)				•	•		•	70
Толтразурил	•	•	•	•	•	•	•	71
Куксурил	•	•	•	•	•	•	•	72

**АЛЬБЕНДАЗОЛ
СУСПЕНЗИЯ 2,5%**ХАЙВОНЛАР ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯСИ
УЧУН СУСПЕНЗИЯСИ**АЛЬБЕНДАЗОЛ
СУСПЕНЗИЯ 10%**ХАЙВОНЛАРНИНГ
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯСИ
УЧУН СУСПЕНЗИЯСИ

Хайвонлардаги инвазион касалликларга қарши курашиш учун хавфсиз восита

- ▶ Нематодлар, цестодлар ва трематодларга нисбатан юқори даражадаги самарадорлик
- ▶ Оригинал рецептура ва зарралар микронизацияси технологияси ҳисобидан суспензиянинг юқори даражадаги турғунлиги ва биологик ўзлаштирилиши
- ▶ Махсус таъм берувчи қўшимчалар воситанинг хайвонлар томонидан яхши истеъмол қилинишини таъминлайди

ТАРКИБИ

1 мл
АЛЬБЕНДАЗОЛ
СУСПЕНЗИЯ

= 25 мг альбендазол



– 7 сутка

ТАРКИБИ

1 мл
АЛЬБЕНДАЗОЛ
СУСПЕНЗИЯ

= 100 мг альбендазол



– 20 сутка

10% Суспензия

Хайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси (10 кг ҳ/м га)	Қўллашлар сони
ЙШХ	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари Сурункали фасциолёз	перорал	0,75 мл	бир марта
			1 мл	
Отлар	Параскаридоз, сторонгилёз, альфортиоз, делафондиоз, аноплецефалёз ва циатостомоз		0,75 мл	
Қўйлар	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари Сурункали фасциолёз		0,5 мл	
			0,75 мл	

2,5% Суспензия

Хайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси (10 кг ҳ/м га)	Қўллашлар сони
ЙШХ	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари Сурункали фасциолёз	перорал	3,0 мл	бир марта
			4,0 мл	
Отлар	Параскаридоз, сторонгилёз, альфортиоз, делафондиоз, аноплецефалёз ва циатостомоз		3,0 мл	
Қўйлар	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари Сурункали фасциолёз		2,5 мл	
			3,0 мл	



АЛЬБЕН-ПРАЗ (ОРАЛ СУСПЕНЗИЯ)

ҲАЙВОНЛАР ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯСИ УЧУН



Албен-Праз таркибида таъсирнинг турли хил усул ва спектрларига эга иккита фаол модда мавжуд.

Альбендазол - бу нематодалар ва цестододаларга қарши, дозалашнинг анчайин юқори даражасида эса, шунингдек, трематодаларнинг етилган босқичларига қарши фаоллиқнинг кенг диапозони билан бензимидазол гуруҳига мансуб синтетик антгельминтик.

Празиквантел квинолин ҳосилалари синфига киради, шистосомозларни даволашда ишлатилади ва, тахминан, мушакларнинг кучли қисқариши ва фалажини келтириб чиқариши, уларнинг қон томирлари деворларидан ажралишига ва олиб ташланишига олиб келиб, кальций гомеостазига зарарли таъсир кўрсатади.

Ҳайвонлар томонидан уч каррадан ошириб юборилган дозалашда альбендазол яхши қабул қилинади. Празиквантел шунингдек кенг хавфсизлик чегарасига эга.

Альбен-Праз қуйидаги дозаларда оғиз орқали нематодалар, сестододалар ва трематодаларга қарши йирик қорамолларни, отларни, қўйларни ва эчкиларни дегельминтизация қилиш учун ишлатилади:

- ▶ ҳайвонларнинг 10 кг вазнига 2 мл ҳисобидан қорамол ва отлар
- ▶ қўй ва эчкилар учун 12 кг ҳайвон вазнига 2 мл

Ишлатишдан олдин яхшилаб чайқатилсин.

Уй ва ҳайвонот боғи ҳайвонларининг барча турларининг суспензия билан даврий дегельминтизацияси (3-4 ойда бир марта) гельминтлардан самарали ҲИМОЯ ҳисобланади.

ТАРКИБИ



== Албендазол
== Празиквантел



- 7 сутка



20 - сутка



Препаратни эмизув даврида бўлган ҳайвонларда қўлламаслик керак.



ИВЕР-ПРАЗ ОРАЛ СУСПЕНЗИЯ



ҲАЙВОНЛАРНИНГ ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРИДА

Ивер Праз қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида паразитлик қилувчи ошқозон-ичак ва ўпка нематодалари, шунингдек, цестодалар ва сўна личинкалари (*Oestrus ovis*) нинг имагиналь ва личинка ривожланиш фазаларида паразитларга қарши таъсирнинг кенг спектрига эга.

Ҳайвонларнинг қон плазмасида празиквантел ва ивермектиннинг максимал концентрацияси препаратни оғиз орқали қабул қилишдан 4-6 соат ўтгач кузатилади. Препарат танадан асосан нажас ва сийдик билан, эмизикли ҳайвонларда сут билан ҳам ажралиб чиқади.

Ивер-Праз, организмга таъсири даражаси бўйича ўртача хавфли моддаларга тегишли, тавсия этилган дозаларда у эмбриотоксик, тератоген ва юқори сезгир таъсирга эга эмас.

Ивер-Праз даволаш мақсадларида бир марта оғиз орқали ишлатилади:

▶ ошқозон-ичак трактининг нематодозаларида қорамол, қўй ва эчкилар (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, хабертиоз, коопериоз, остертагиоз, стронгилоидоз, трихост-ронгилез, трихоцефалез, неоаскариоз); ўпканинг нематодозаларида (диктиокаулез, мюллерриоз, цистокаулез, протостронгилез) ва цестодозаларда (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз); шунингдек нематодозаларда ҳайвонларнинг 20-25 кг вазнига 1 мл дан алоҳида-алоҳида

▶ қўйлар - эстрозда, ҳайвонларнинг 20 кг вазнига 1 мл дозада индивидуал равишда.

Оммавий даволанишдан олдин препаратнинг ҳар бир партияси ҳар хил ёшдаги ва вазндаги ҳайвонларнинг кичик гуруҳида (5-7 бош) синовдан ўтказилади. 3 кун ичида асоратлар бўлмаса, бутун чорва молларини қайта ишлашга киришилади.

Қоида тариқасида, препаратни ушбу йўриқномага мувофиқ қўллашда ҳайвонларда ноҳўя таъсирлар ва асоратлар кузатилмайди.

Препаратни соғин сигирларга, шунингдек, ҳомиладор сигирлар, қўйлар ва эчкиларда болалашга (қўзилашга) 28 кундан кам вақт олдин, чарчаган, юқумли касалликларга чалинган ва соғайиб кетаётган ҳайвонларга қўллаш тақиқланади.

ТАРКИБИ



Ивермектин +
Празиквантель



- 10 сутка



- 27 сутка



Мониезиозни даволашда юқори самарали!



АЛЬБЕНДАЗОЛ БОЛЮС 600 мг ҲАЙВОНЛАР ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯСИ УЧУН



Альбендазол болюс 600 мг (albendszole bolus 600 mg)- антгельминтик бўлиб, унинг фаол моддаси альбендазол ҳисобланади.

У 600 мг дан альбендазолни ўз ичига олган болюслар шаклида чиқарилади.

Ташқи кўринишига кўра, бу бир томонида синдириш учун ариқчага эга яшил рангли узунчоқ болюс.

Альбендазол кенг спектрли антгельминтик ҳисобланади, Ошқозон-ичак ва ўпка нематодлари, цестодлар, шунингдек катталар жигар трематодаларига қарши самарали, овоцидли ва лярвицидли таъсирига эга.

Альбендазол-600 болюс қуйдаги гельминтозларда йирик ва майда шохли қорамол дегельминтизацияси учун қўлланилади:

Касалликларнинг номлари	Йирик шохли мол	Йирик шохли мол
Трематозодлар (катта жигар трематодлари)	Fasciola hepatica	Fasciola hepatica, Fascioides magna
Ошқозон гельминтозлари (катта организмлар ва 4-личинкали босқич)	Ostertagia ostertagi Barberpole (Haemonchus contortus, H.placei), Trichostrongylus axei	Ostertagia circumcincta, Marshallagia marshalli, Barberpole (Haemonchus contortus), Trichostrongylus axei
Ичак гельминтозлари (катта организмлар 4-личинкали босқич)	Nematodirus spathiger, N.helvetianus, Cooperia punctata, C.oncophora	Nematodirus spathiger, N.fificollis, Cooperia oncophora
Ичак гельминтозлари (катта организмлар)	Bunostomum phlebotomum, Trichostrongylus colubriformis Oesophagostomum radiatum	Trichostrongylus colubriformis Oesophagostomum columbianum, Chabertia ovina
Ўпка гельминтозлари (катта организмлар ва 4-личинкали босқич)	Dictyocaulus viviparus	Dictyocaulus filaria

Альбендазол болюс 600 мг ҳайвонларнинг нематодозлари ва тсестодозларини даволашда ҳайвонларнинг 1 кг вазнига 7,5 мг альбендазол миқдоридаги дозаларда қўлланилади; трематодозларни даволаш учун - 1 кг ҳайвон вазнига 10 мг альбендазол.

Препаратни соғиладиган ҳайвонларга ва уруғлангандан кейинги дастлабки 45 кун ичида қўллашга йўл қўйилмайди.

Ҳайвонларни гўшт учун сўйишга препарат охирги марта қўлланилгандан 14 кундан илгари рухсат этилмайди.



АЛЬБЕНДАЗОЛ БОЛЮС 2500 мг ҲАЙВОНЛАР ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯСИ УЧУН



Альбендазол болүс 2500 мг (albendszole bolus 2500 mg) препарати битта болүсда таркибида 2500 мг фаол альбендазол, ёрдамчи моддалар ва тўлдиргичларни ўз ичига олган антгельминтик ҳисобланади.

Ташқи кўринишига кўра препаратлар синдириш учун кўндаланг чизикли яшил рангли болүс.

Альбендазол - кенг спектрли антгельминтик бўлиб, нематодаларга (жинсий етук ва етук бўлмаган шаклларга), цестодалар ва трематодаларга (фақат жинсий етук) қарши яққол антигельминтли таъсир кўрсатади.

Альбендазол таъсирининг механизми углевод метаболизмини ва гельминтларнинг микротубуляр функциясини бузишдан иборат бўлиб, бу уларнинг ўлимига ва ҳайвон танасидан чиқиб кетишига олиб келади.

Препарат кам токсик, терапевтик дозаларда кўринадиган ножўя таъсирларга эга эмас.

Эмбриотоксик ва тератоген таъсирга эга.

Альбендазол болүс 2500 мг йирик шохли қорамолларда қуйидаги гельминтозларнинг олдини олиш ва даволаш учун қўлланилади:

- ▶ ошқозон-ичак гельминтлари: *Bunostomum*, *Cooperia*, *Chabertia*, *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Oesophagostomum*, *Ostertagia*, *Strongyloides* ва *Trichostrongylus* spp
- ▶ ўпка гельминтлари: *Dictyocaulus viviparus* ва *D. filaria*
- ▶ лента гельминтлари: *Moniezia* spp
- ▶ жигар гельминтлари: катталар *Fasciola hepatica*

Болүслар оғиз орқали, бир марта, дозаларда олдиндан оч қолдирилмасдан берилади: нематодозалар ва цестодозаларда 300 кг ҳайвон вазнига 1 болүс микдорида, фасциолёзада (жинсий етук шакл) - 250 кг ҳайвон вазнига 1 болүс.

Оммавий дегельминтизация қилишдан олдин препаратнинг ҳар бир партияси олдиндан ҳайвонларнинг кичик гуруҳида (5-10 бош) синовдан ўтказилади. Уч кун ичида асоратлар бўлмаса, бутун чорва молларини қайта ишлашга киришилади.

Препаратни соғин сигирларга ва уруғлантиришдан кейинги дастлабки 45 кун ичида қўллашга йўл қўйилмайди.

ТАРКИБИ



2500 мг Альбендазол



- 27 сутка



АЛЬБЕНДАЗОЛ ГРАНУЛАЛАРИ 20%

ЖОНВОРЛАРНИ
ДЕГЕЛЬМИНТАЦИЯСИ
УЧУН ГРАНУЛАРАР



Ҳайвонлардаги инвазион касалликларга қарши курашиш учун хавфсиз восита

- ▶ Нематодлар, цестодлар ва трематодларга нисбатан юқори даражадаги самарадорлик
- ▶ Оригинал рецептура ва зарралар микронизацияси технологияси ҳисобидан грануларнинг юқори даражадаги турғунлиги ва биологик ўзлаштирилиши
- ▶ Махсус таъм берувчи қўшимчалар воситанинг ҳайвонлар томонидан яхши истеъмол қилинишини таъминлайди

ТАРКИБИ



= 200 мг альбендазол



- 4 сутка



- 20 сутка

Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси (100 кг ҳ/м га)	Қўллашлар сони
ЙШХ	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари	перорал	3,75 г	бир марта
	Сурункали фасциолёз		5 г	
Отлар	Параскаридоз, сторонгилёз, альфортиоз, делафондиоз, аноплецефалёз ва циатостомоз		3,75 г	
Қўйлар	Мониезиоз, ўпка ва ошқозон-ичак нематодозлари		2,5 г	
	Сурункали фасциолёз		3,75 г	
Итлар	Нематодозлар		3,75 г	
	Цестодозлар		7,5 г	икки марта, 24 соат танаффус билан
Қ/х паррандаси	Аскаридоз ва гетеракидоз		5 г	



АЛЬБЕНОКСИ 900

ЖОНИВОРЛАРНИ
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯЛАШ
УЧУН



СОҒЛОМ ЖИГАР!

Дори воситаси таркибига кирувчи Альбендазол ошқозон-ичак тракти ва ўпканинг вояга етган ва вояга етмаган нематодлари, шунингдек цестодлар ва вояга етган трематодларга нисбатан фаол.

Оксиклозанид кавш қайтарувчи ҳайвонларда паразитлик қилувчи трематодларнинг барча ривожланиш босқичларига нисбатан трематодоцид таъсирга эга, шу жумладан *Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.*, *Dicrocoelium lanceatum*, шунингдек паррандаларда паразитлик қилувчи *Echinostoma revolutum*, *Prostogonimus ovalis* нисбатан фаол.

Қўллаш тартиби

Альбендазол+Оксиклозанид йирик шохли моллар, қўй, эчки, товуқ, ғоз ва ўрдакларни нематодоз, цестодоз ва трематодозларида дегельминтизациялаш учун қўлланилади.

Кавш қайтарувчи ҳайвонларга дори воситаси перорал равишда, бир марта индивидуал қуйидаги дозаларда қўлланилади:


- ▶ ошқозон-ичак тракти нематодозларида (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, хабертиоз, коопериоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, трихоцефалез, неоаскариоз), ўпка нематодозларида (диктиокаулез, мюллерииоз, цистокаулез) ва цестодозларда (мониезииоз, авителлиноз, тизаниезииоз) 70 кг ҳайвон массасига 1 донa болюсдан;
- ▶ трематодозларда (фаециолез, дикроцелиоз, эуристремоз и парамфистомидоз),
- ▶ ҳамда остертагииоз ва протостронгилезда – 60 кг ҳайвон массасига 1 донa дозадан.

Ғоз, ўрдак ва товуқларга нематодозларда (гангулетеракидоз, аскаридиоз, гетеракидоз), трематодозларда (эхиностоматидоз, простогонимоз) ва цестодозларда (дрепанидотениоз, гименолепидоз, райетиноз) дори воситаси 5 кг парранда массасига 0,1 дозадан кетма-кет икки кун давомида, индивидуал ёки гуруҳ усулида (100 бошдан ошмаган) эрталабки озуқа билан берилади.

Дори воситасининг ҳисобланган миқдори 1 та паррандага 50 г озуқа ҳисобидан аралаштирилади.

Ёппасига дегельминтизациялашдан олдин дори воситасининг ҳар бир сери-яси дастлаб ҳайвонларнинг кичикроқ гуруҳларида (5-10 бош) синалиб. Агар уч кун давомида қўшимча асоратлар кузатилмаса, барча бош ҳайвонларга ишлов берилади.

Грануларлар ТАРКИБИ



— 600 мг - Альбендазол
— 300 мг - Оксиклозанид



- 20 сутка



- 5 сутка



- 4 сутка



Альбендазол+Оксиклозанид – кенг таъсир қўламидаги антигельминтик!



ЛЕВАОКСИ 900

ҲАЙВОНЛАРНИ
ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯЛАШ
УЧУН



СОҒЛОМ ЖИГАР!

ЛЕВАОКСИ 900 – кенг қўламдаги таъсирга эга антигельминтик, вояга етган ва вояга етмаган нематод ва цестодларга, шунингдек вояга етган трематодларга нисбатан фаол.

Овоцид таъсирга эга бўлган ҳолда яйловларни гельминтлар билан зарарланишини камайтиради.

Левамизол йирик шохли моллар, қўй, эчки ва паррандалардаги ўпка ва ошқозон-ичак нематодларининг личинкалари, ҳамда вояга етган шакллариغا ҳам самарали таъсир кўрсатади.

Оксиклозанид кавш қайтарувчи ҳайвонлар ва чўчқаларда паразитлик қилувчи трематодларнинг барча ривожланиш босқичларига трематоцид таъсир кўрсатади, шу жумладан *Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.*, *Dicrocoelium lanceatum*, шунингдек паррандаларда паразитлик қилувчи *Echinostoma revolutum*, *Prostogonimus ovatus* ларга нисбатан сезиларли таъсирга эга.

Қўллаш тартиби

Дори воситасини тухум қўювчи товукларга, тухумда тўпланиши сабабли қўлланилмайди, юқумли касалликлар билан касалланган ва ориқлаган ҳайвонларга, ургочи ва эркак ҳайвонларга қочириш даврида, қўй, эчки ва бўғоз сигирларга бўғозликнинг дастлабки уч ойида қўлаш тақиқланади.

Қуйидагиларда қўлланилади:

- ▶ а) ўпка нематодозларида (диктиокаулез, цитокаулез, мутефеноз, протостронгилоз);
- ▶ б) трематодозда (ўткир ва сурункали фасциолез, дикроцелиоз, парамифомидоз);
- ▶ в) ошқозон-ичак нематодлари (гемонхоз, буностомоз, эзофагостомиоз, нематодоз, остертагиоз, хабертиоз, силилоидоз, трихостронгилоидоз, трихоцефалиаз, нео-аскаридоз);
- ▶ г) цестодиозларда (авителлиноз, тизаниезиоз, *moniezia expansa* ва *moniezia benedem*).

Қўлланилиши ва дозалари

Доза бирликлари: бузоқлар, йирик шохли моллар, қўй, эчкиларга, 1 болюсдан / 100 кг тана массасига; ит ва мушукларга, 1 болюсдан / 70 кг тана массасига; уй паррандаларига, 1 болюсдан / 30 кг тана массасига.

1. Ушбу дори воситасини соғин ҳайвонларга қўллаш тақиқланади.

2. Дори воситасини туяларга қўллаш ман этилади. Уни отларга эҳтиёткорлик билан қўлланилади.

3. Ўта ҳолсиз ёки жигар ва буйраклар дисфункцияси бўлган ҳайвонларга эҳтиёткорлик билан қўлланилади.

ТАРКИБИ



600 мг - Оксиклозанид
300 мг - Левамизол



- 3 кун



B12 ВИТАМИНЛИ ДИМИНАЗИН

Diminazene avec Vitamin B12

ҲАЙВОНЛАРНИНГ ҚОН-ПАРАЗИТАР
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН



Умумий маълумот

B12 витаминли диминазин (Diminazene avec Vitamin B12) - ҳар бир пакетда 10,5 г диминазин ацетурат, 50 мг B12 витамини ва 23,6 г гача антипирин ёки 1,05 г диминазин ацетурат, 5 мг B12 витамини ва 2,36 г гача антипирин бўлган препарат.

B12 витаминли диминазин қуйидагилар учун самарали: *Babesia bigemina*, *B. bovis*, *B. ovis*, *B. molasi* ва *B. canis* келтириб чиқарган бабезиозда; *Trypanosoma congolense*, *T. vivax* ва *T. Brucei* келтириб чиқарган трипанозомозда; *Theileria annulata*, *T. mutans* келтириб чиқарган тейлериозда ва трипаносомоз и бабезиоз аралаш инвазияларда, шунингдек келиб чиқиши номаълум бўлган иситмада.

Препаратнинг бир қисми бўлган диминазин ацетурат тезда қондаги паразит ДНК ҳужайралари фаоллигини пасайтиради, бу бир неча соат ичида уларнинг ўлимига олиб келади.

B12 Витаминли Диминазин йирик қорамол, қўй, эчки, от ва итларнинг қон-паразитар касалликларини даволаш учун ишлатилади.

Препарат стерилланган сувда эритма шаклида мушак ичига чуқур киритилади. Инъекция учун эритма олиш учун 23,6 г пакетнинг ичидагини 150 мл, 2,36 г пакетнинг ичидагини 15 мл стерилланган сувда эритиб, яхшилаб аралаштириш керак. Эритма шаффоф бўлиши лозим.

1 кг ҳайвон вазнига 3,5 мг диминазин ацетуратни ҳисоблашдан келиб чиқиб, тавсия этилган дозалаш:

Ҳайвон вазни (кг)	Тайёр эритма ҳажми (мл)	Диминазин ацетурат миқдори (мг)
20	1	70
40	2	140
50	2,5	175
100	5	350
200	10	700
300	15	1050
40	20	1400
500	25	1750

Даволаш учун битта инъекция етарли.

T. brucei билан зарарланганда, препарат дозасини икки барабар ошириш керак. Касалликнинг чидамли қўзғатувчилари учун дозани ҳайвонларнинг 100 кг вазнига 13,18 мл тайёр эритмагача (яъни 1 кг ҳайвон вазнига 8 мг диминазин ацетуратгача) ошириш мумкин, лекин ҳар бир ҳайвон учун 65,7 мл дан ошмаслиги керак (яъни ҳайвонга 4 г дан ортиқ диминазин ацетуратдан ортиқ эмас).

Агар *T. annulata* юктирилса, препарат антибиотиклар билан биргаликда ишлатилиши керак.



- 1 сутка



- 1 сутка



БУПАРВАКОН 5%



Қон паразитлари муаммосини тез ва ишончли ҳал этиш

- ▶ Биринчи инъекцияданоқ 98,8% самарадорлик
- ▶ Тез даволаш самараси – 3-5 соат
- ▶ Ҳароратни туширувчи ва оғриқни қолдирувчи таъсир

ТАРКИБИ

1 мл
БУПАРВАКОН

= 50 мг бупарваккон



42 сутка



2 сутка



Бупарваккон - тейлериознинг барча шаклларини даволаш ва олдини олиш учун самарали бирикма қиладиган янги хусусиятларга эга гидроксиафтаквиноннинг иккинчи авлоди.

Бупарваккон 5% препарати *Theileria parva*, *T. orientalis* (sergenti) ва *T. annulata* ga қарши фаолдир. У шизонт босқичларига қарши ва пироплазм босқичларга қарши фаол бўлиб, касалликнинг инкубация даврида ва тейлериознинг клиник белгилари намоён бўлишида ишлатилиши мумкин.

Бупарваккон 5% йирик шохли қорамолнинг тейлериозини даволаш учун ишлатилади.

Препарат 20 кг ҳайвон вазнига 1 мл дозада фақат мушак ичига юборилади (бўйин мушакларига тавсия этилади), бу 1 кг ҳайвон вазнига 2,5 мг фаол бупарваккон моддасига тўғри келади.

Препаратнинг бир марталик инъекцияси одатда етарли бўлади. Касалликнинг оғир ҳолатларида бир хил дозада такрорий юбориш (20 кг ҳайвон вазнига 1 мл) биринчи инъекциядан 48-72 соат ўтгач амалга оширилиши мумкин.

Препаратни вена ичига ёки тери остига қўллаш мумкин эмас. Тананинг битта участкасига 10 мл дан кўп бўлмаган препаратни киритиш мумкин эмас.

Касал ҳайвонлар стрессга (ҳайдаш, чўмилиш), шунингдек, тўлиқ соғайгунча эмлашга дучор қилинмасликлари керак, чунки тейлериозда иммунитет тизимининг фаоллиги пасаяди.

Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони	Даволаш курси
ЙШХ МШХ Отлар	Барча шакилларида	м/и	1 мл/20 кг	Бир марта	Зарурат туғилганида 48-72 соатдан кейин такрорлаш керак
Итлар			0,5 мл/10 кг	Бўлган ҳолда 1-2 соат танаффус билан 2 марта м/и юбориш	

БУПАРВАКОН препаратини ҳайвон бабезиоз ва анаплазмозга қарши тирик вакцина билан эмланганидан кейин 4 ҳафта давомида қўллаш тақиқланади.



КЛОЗАНТЕЛЬ 5% ИНЪЕКЦИЯ




Йирик ва майда шохли молларда гельминтозлар ва сўнали инвазия ларни даволаш ва уларнинг олдини олиш учун дори воситаси

- ▶ Фасциолёзни даволашда максимал самарадорлик
- ▶ Нематодозлар ва сўнали инвазияларни даволаш
- ▶ Инъекцион эритманинг йўналтирилган таъсири



ТАРКИБИ



50 мг клозантел



28 сутка



12 сутка



Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
ЙШХ	Нематодозларда ва фасциолёзда Гиподерматозда	м/и ёки т/о	0,5 мл/10 кг 1 мл/10 кг	Бир марта, битта жойга 20 мл дан кўп эмас
МШХ	Нематодозларда ва эстроозларда Фасциолёзда	т/о	0,5 мл/10 кг 1 мл/10 кг	Бир марта, битта жойга 10 мл дан кўп эмас



**Фасциолёзни даволашда
1-рақамли препарат
Соғлом жигар**

КЛОЗАНТЕЛЬ препаратини соғиладиган чорвада, шунингдек препарат сутга ажралиб чиқишини инobatга олган ҳолда сигирлар, қўйлар ва эчкиларни болалашига 30 суткадан кам вақт қолганида қўллаш тақиқланади.



ХИТ

ИВЕРМЕКТИН 1% ҲАЙВОНЛАРНИНГ ЭНДО - ВА ЭКТОПАРАЗИТЛАРИГА ҚАРШИ ИНЪЕКЦИЯЛАР.



Кенг турдаги паразитларга қарши максимал самарадорликка эга паразитларга қарши комплекс

- ▶ Мушак ичига ва тери остига киритиш қўллашнинг қулайлигини ва тез намоён бўладиган терапевтик самарани таъминлайди
- ▶ Эктопаразитлар ва нематодларнинг кенг турларига қарши юқори даражадаги самарадорлик
- ▶ Таркибида ивермектиннинг энг фаол изомерлари мавжуд
- ▶ Препаратнинг махсус шакли киритилиш жойидаги тўқималарнинг таъсирланишини келтириб чиқармайди

ТАРКИБИ



=

10 мг ивермектин



28 сутка



Нематодозлар



Бўғимоёқлилар (Сўналар ва хашоратлар)



Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
Йирик шохли моллар Туялар Қўйлар Эчкилар	Нематодозлар ва арахноэнтомоозлар (стронгилоидоз, трихоцефалёз, диктиокаулёз, протостронгилёз, мюлериоз, гемонхозе, остертагиоз, нематодироз, маршаллагияоз, коопериоз, хабертиоз, эзофагостомоз, гиподерматоз, буностомоз, малофагоз, эстроз, саркоптоз, хориоптоз)	м/и	1 мл/50 кг	бир марта сағри ёки бўйин соҳасига
	Саркоптоидозларнинг оғир ҳолатлари (саркоптоз, хориоптоз, псороптоз)		1 мл/50 кг	8-10 кун танаффус билан икки марта сағри ёки бўйин соҳасига

Сути озик-овқат мақсадларида фойдаланиладиган соғин ва бўғоз урғочи молларда лактация бошланишига 28 суткадан кам вақт қолганида қўллаш **ТАҚИҚЛАНАДИ**



ИВЕРМЕКТИН ГЕЛЬ

ОТЛАРНИ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ
ҚИЛИШ УЧУН (Ivermectin Gel).



Қуйидаги қўзғатувчилар томонидан келиб чиққан отларнинг инвазив касалликларини даволаш ва олдини олиш учун тавсия этилади:

- ▶ ошқозон-ичак трактининг нематодозлари - Acaridae, Strongylidae, Strongyloididae, Oxyurata, Trihonematidae; Spiruridae
- ▶ ўпка нематодалари - Dictyocaulus spp
- ▶ нематодлар - Parafilaria multipapillosa, Oncherca cervicalis
- ▶ личинкалар - Gasterophilus spp

Доза 20 кг тана вазнига 1 мл гелдан иборат.

Препарат шприц найчаси орқали тилнинг илдизига бир марта юборилади.

ТАРКИБИ



4 мг - Ивермектин



**4 ойлик гача бўлган тойларда
қўллаш мумкин эмас!**

Дегельминтизация қилинганидан кейин ҳайвонларни сўйиш препарат қўллаганидан сўнг 28 кун ўтгач рухсат этилади.



**Каналар келтириб чиқарадиган касалликларда даво
8-10 кундан кейин бир хил дозада такрорланади.**






ИВЕРМЕКТИН ПЛЮС

(ИНЪЕКСИЯ ЭРИТМАСИ) ХАЙВОНЛАРДАГИ ЭНДО
ВА ЭКТОПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ
УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ.



ТАРКИБИ



= 5 мг ивермектин
= 125 мг клозантел



28 сутка



Нематодозлар



Бўғимоёқлилар (Сўналар ва хашоратлар)



Таркиби:

Ивермектин Плюс (инъексия эритмаси) – ҳар бир мл таркиби иккита фаол субстанция,

яъни 5 мг ивермектин ва 125 мг клозантел, шунингдек ёрдамчи тўлдирувчилар, яъни бензил спирт, пропилен гликол, гидроокис натрий ва инъексия учун сувдан иборат бўлган антипаразитар препарат.

Сақланиши:

Препарат қуруқ, ёруғлик нуридан ҳимояланган ва болалар қўли етмайдиган жойда 25 °С дан паст ҳароратда сақлансин.

Кўрсатилган сақлаш шароитларига амал қилинганда препаратнинг яроқлилиқ муддати ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 3 йил.

Қўлланилиши:

Ивермектин Плюс йирик шохли қорамоллар, қўйлар, эчкилар ва кийиклардаги диктиокаулез, гемонхоз, остертагиоз, трихоцефалез, коопериоз, нематодироз, буностомоз, стронгилоидоз, фассиолез, телязиоз, гиподерматоз ва эстрозларни даволашда қўлланилади.

Препарат тери остига ёки мускул орасига курак ости қисмига 50 кг хайвон вазнига 1 мл, яъни 1 кг хайвон вазнига 0,1 мг ивермектин ва 2,5 мг клозантел меъёрида бир марта юборилади.



ЭНДЖАТ-25 ЖОНИВОРЛАРНИ ДЕГЕЛМИНТИЗАЦИЯ ҚИЛИШ УЧУН



Энджат (*Moniezia sp.*) қуйидаги цестододларга қарши самарали:

- ▶ Трематодлар (*Fasciola hepatica*, *Fascioloides magna* и *Dicrocoelium dentriticum*), ошқозон-ичак нематодлари (етилган ва етилмаган босқичдаги ҳамда тухмларига), яъни *Ostertagia ostertagi*, *Haemonchus sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Nematodirus sp.*, *Cooperia sp.*, *Bunostomum sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Oesophagostomum sp.*, ва ўпка нематодалари (*Dictyocaulus viviparus* и *D. filaria*).

Энджат-25 хар бир хайвонга стандарт меъёрловчи ускунадан фойдаланган ҳолда:


а) цестодозлар ва нематодозларни даволаш ва профилактика қилиш учун:

- ▶ йирик шохли қорамоллар ва туяларга 50 кг хайвон вазнига 15 мл (1 кг га 7,5 мг албендазол) меъёрида;
- ▶ қўйлар ва эчкиларга 10 кг хайвон вазнига 2 мл (1 кг га 5 мг албендазол) меъёрида;
- ▶ фоссиелезни даволаш ва профилактика қилиш учун:
- ▶ йирик шохли қорамоллар ва туяларга 50 кг хайвон вазнига 20 мл (1 кг га 10 мг албендазол) меъёрида;
- ▶ қўйлар ва эчкиларга 10 кг хайвон вазнига 3 мл (1 кг га 7,5 мг албендазол) меъёрида;

Препаратни қўллашдан олдин флаконни яхшилаб чайқатинг.

Энджат-25 ни қўйлардаги ўткир фассиелезларни даволаш учун қўллашга тавсия этилмайди.

ТАРКИБИ



= 25 мг - албендазол



- 8 сутка



- 14 сутка



ТИЛОЗИН 99,8 % (W.S.P)

ЖОНИВОРЛАРНИНГ ВА ҚУШЛАРНИНГ БАКТЕРИЯЛИ
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН



Тилозин 99,8% - бу 1 мг таркибида 998 мг тилозин тартрат бўлган препарат.

Тилозин *Streptomyces fradiae* штамми томонидан ишлаб чиқарилган макролидлар гуруҳининг антибиотиғи бўлиб, *Leptospira* spp., *Erysipelas* spp., *Haemophilus pertussii*, *Moraxella bovis*, *Borrelia anserina*, *Treponema hyodysenteriae*, *Mycoplasma* spp. каби аксарият грамижобий ва граммасалбий бактерияларга қарши бактериостатик таъсир кўрсатади.

Тилозин айниқса *Mycoplasma gallisepticum* инфекциялари учун самарали ҳисобланади.

Тилозин 99,8% антибактериал ветеринария препаратларининг турли хил дозалаш шаклларини ишлаб чиқаришда ишлатилади ва йирик ва майда қорамол, итлар, мушуклар ва қушларда бронхопневмонияни даволаш учун тайинланади; йирик қорамол мастити; энзоотик пневмония, артрит, дизентерия ва атрофик ринит; қўй ва эчкиларнинг юқумли ағалактияси, шунингдек вирусли касалликларда иккиламчи инфекциялар.

Тилозин 99,8% препаратлари одатда қуйидагича қўлланилади:

- ▶ Тилозин 99,8% ни оғиз орқали сув билан аралаштирилган ҳолда 2 литр ичимлик сувига 1 грам меъёрида 3-5 кун давомида берилади.
- ▶ Клиник соғайиб кетгандан сунг препаратни 24 соат давомида бериб туриш лозим.

Даволаш курси 3 кун, микоплазмоз билан 5 кун.

Тавсия этилган дозада препарат ноҳўя таъсирларни келтириб чиқармайди.

Тилозин, бошқа макролидлар сингари, фениколлар, линсосамидлар ва бошқалар ва бошқа макролидлар билан биргаликда ишлатилмаслиги керак.



- 8 сутка



**Респиратор микоплазмозда -
самарали восита**

- ▶ юқори даражадаги кенг қамровли
- ▶ тез сўрилади (қўллангандан кейин керакли терапевтик консентрацияга 1-3 соатда еришилади)
- ▶ овқат ҳазм қилишни яхшилашга ёрдам беради
- ▶ ичак эпителиясини тезда тиклашга ёрдам беради
- ▶ қушнинг танасига узоқ муддатли таъсир кўрсатади (18 соатгача)




ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 99,8% (W.S.P)



Окситетрациклин кенг таъсир доирасига эга тетрациклинлар гуруҳидан биосинтетик антимикробли воситалар гуруҳига киради.

ТАРКИБИ



Bordetella, *Corynebacterium*, *Campylobacter*, *E. coli*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* и *Streptococcus* spp., *Mycoplasma*, *Rickettsia*, *Chlamydia* spp. ва бошқалар каби грамсалбий ва грамижобий микроорганизмларга қарши самарали.

Окситетрациклин юқори терапевтик таъсир кўрсатиб, органларга, тўқималарга ва тана суюқликларига яхши кириб боради.

Окситетрациклин 99,8% окситетрациклин, колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, куйдирги, пневмония ва вирусли бўлмаган этиология, мастит, эндометрит, вагинитга сезгир бактериялар сабаб бўлган ҳайвонларнинг ошқозон-ичак ва нафас йўллари касалликларини даволаш учун ишлатилади.

Препарат 5, 10 ёки 20 мл дистилланган сувда, физиологик эритмада ёки 0,5-2,0% новокаинда ишлатишдан олдин бевосита эритилиб, мушак ичига юборилади, Эритмадаги антибиотик барқарор эмас, тайёрланган эритмаларни сақлашга йўл қўйилмайди.

Препарат қуйидаги дозаларда қўлланилади:

- ▶ 6 ойгача бўлган бузоқлар ва 4 ойгача бўлган қўзилар ҳайвонларнинг 1 кг вазнига 9 мг;
- ▶ олти ойлик йирик қорамолларнинг 1 кг вазнига 7 мг.

Даволаш 5-7 кун давом этади, инъекция оралиғи 10-12 соатни ташкил қилади.

Касаллик белгилари йўқолгандан сўнг, препаратни 1-3 кун давомида қўллаш давом эттирилади.

Ичимлик суви билан қўлланганда1 грам препарат 50-100 кг тирик вазнга.




ДОКСИТИЛ-ДТ (W.S.P)

ҲАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРНИНГ
БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ
УЧУН ДОКСИТИЛ-ДТ (КУКУН)



ТАРКИБИ



== 100 мг доксициклин гидрохлориди
== 200 мг - тилозин тартрат



ЙШХ ва МШХ ларда - 14 сутка
Паррандаларда - 8 сутка

Доксициклин ва тилозиннинг бирикмаси синергидли таъсирга эга. Препарат грамижобий ва грамсалбий микроорганизмларнинг кенг доирасига қарши самарали бўлади, препаратнинг таъсир тури - бактериостатик.

Доксициклин микоплазмалар, спирохеталар, хламидия ва рикетсияларнинг аксариятига, шунингдек грам-ижобий бактерияларнинг баъзи штаммлари: *Staphylococcus* ва *Streptococci* га қарши фаолдир, аммо вақт ўтиши билан ушбу бактерияларнинг қаршилиги ошиб боради. Доксициклин уларга қарши фаол бўлган грамижобий бактерияларга қуйидагилар киради: *Actinomyces* sp., *Bacillus anthracis*, *Clostridium perfringens* ва *tetani*, *Listeria monocitogenes* и *Nocardia*. Грамсалбий микроорганизмлар орасида доксициклинга қуйидагилар сезгир: *Brucella* sp., *Bordetella* sp., *Bartonella*, *Haemophilus* sp., *Pasteurella multocida*, *Shigella* ва *Yersinia*. *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Bacteroides*, *Enterobacter*, *Proteus*, *Pseudomonas aeruginosa* штамmlарининг аксарияти доксициклин таъсирига чидамли.

Тилозин тартрат грамсалбий ва грамижобий микроорганизмларга қарши фаолдир, жумладан: энтеробактерияларга (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella*, *Leptospira*, *Proteus* ва *Serratia* баъзи турларига), *Pseudomonas aeruginosa*, *Actinobacillus* spp., *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus aureus*, *Serpulina hyodysenteriae*, *Bordetella bronchiseptica*. *Mycoplasma* spp.

Докситил-ДТ бузоқларни, қўзиларни, улоқчаларни, итларни ва паррандаларни тилозин ва доксициклинга сезгир микроорганизмлар келтириб чиқарадиган касалликлардан даволаш учун ишлатилади.

Препарат қуйидаги дозаларда ичимлик суви билан оғиз орқали юборилади:

- ▶ бузоқлар, қўзилар, улоқчалар, итларга ҳайвоннинг 1 кг вазнига 40 мг препарат миқдорида кунига 1 марта, даволаш курси 3-5 кун;
- ▶ парранда учун 1 кг қуш вазнига 250 мг препарат ёки 1 литр ичимлик сувига 2,5 г препарат миқдорида 3-5 кун давомида.

Препаратни соғиладиган эмизувчи ҳайвонларда ва тухум қўядиган товуқларда қўллаш мумкин эмас.



ЭНФОРЛОКС

ХАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН



Энрофлокс 10% (Enroflox 10%) - бу 1 мл таркибида 100 мг Энрофлоксацинни ўз ичига олган энрофлоксациннинг суви эритмаси.

Препаратнинг таркибига кирувчи энрофлоксацин фторхинолонлар гуруҳига киради ва антибактериал ва и анти- микоплазматик таъсирнинг кенг спектрига эга, грам-ижобий ва грамсалбий бактерияларга {Brucella, E. Coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Klebsiella spp., Corynebacterium, Listeria, Proteus spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. ва бошқалар}, шунингдек микоплазмаларга {Mycoplasma spp.} қарши фаолдир.

Бактерияларнинг препаратга қаршилиги нисбатан секин ривожланади, чунки энрофлоксациннинг микрога таъсир механизми бактерия хужайраси ядросидаги ДНК спиралининг кўпайишига таъсир қиладиган гираза ферменти фаоллигини ингибирлаш билан боғлиқ.


Энрофлокс 10% ошқозон-ичак трактидан яхши ва тез сўрилади ва организмнинг барча аъзолари ва тўқималарига кириб боради. Препаратнинг қондаги максимал контсентрациясига у киритилгандан кейин 1-2 соат ичида эришилади ва 6 соат давом этади, терапевтик концентрацияси эса 24 соат давомида.

Энрофлокс 10% бронхит, пневмония, бронхопневмония, колисептицемия, сальмонеллёз, қушлар тифи, энтерит, артрит, мастит, метрит, плацентани тутилиши, пастереллёз, нефрит, цистит, уретрит, стафилококк инфекциялари, микоплазмоз каби нафас олиш тизими, ошқозон-ичак тракти ва таносил органларнинг кўпгина касалликлар ва энрофлоксацинга сезгир патогенлар келтириб чиқарадиган бошқа касалликларни даволаш учун ишлатилади,.

Препарат хайвонларга ва паррандаларга 3-4 кун давомида қуйидаги дозаларда оғиз орқали юборилади:

- ▶ йирик шохли қорамоллар, қўйлар, эчкилар, қуёнлар, итлар ва мушукларга 20 кг хайвон вазнига 1 мл Энрофлокс 10% миқдорида 24 соат оралиқ билан;
- ▶ паррандаларга - препарат ичимлик суви билан 1 мл Энрофлокс 10% нисбатиди 2 литр сувга 3-4 кун давомида, салмонеллёзда билан 5 кун ичида ичилади. Парранданинг 1 кун давомида сувга бўлган эҳтиёжидан келиб чиқадиган миқдорда препарат эритмаси тайёрланади.

ТАРКИБИ



=

100 мг - Энрофлоксацин



- 14 сутка



- 7 сутка

Даволаш даврида парранда фақат таркибида дори бор сувни олиши керак.

Энрофлокс 10% тухум кўядиган товуқларга қўлланилишига йўл қўйилмайди, чунки энрофлоксацин тухумлар билан, шунингдек бактериостатик антибиотиклар (левомицетин, тетрациклин, макролидлар) теофилин ва стероидлар билан бир вақтда ажралиб чиқади.




Enrocol® OR



Enrocol® OR - (оғиз орқали юбориш еритмаси) хайвонлар ва қушлардаги бактериал касалликларни даволаш учун қўлланилади.

- ▶ Даволаш курсининг солиштириладиган қиймати билан энрофлоксацин асосидаги монопрепаратларга қараганда самаралироқ
- ▶ Таркибига кирувчи компонентларнинг таъсири кучайиши ҳисобидан юқори даражадаги фаоллик

ТАРКИБИ



энрофлоксацин 100 мг
колистин 2 000 000 ME



11 сутка

Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
Колибактериоз, сальмонеллёз, сурункали респиратор касалликлар, стрептококкоз, некротик энтерит, гемофилёз, микоплазмоз, аралаш инфекциялар ва вирусли касалликлардаги иккиламчи инфекцияларда даволаш-профилактика мақсадларида паррандаларда қўлланади	Перорал	0,3 - 0,5 мл/1 л сувга	3-5 кун давомида





ФЛОРФЕНИКОЛ ОР

Кушлардаги бактериал касалликларни даволаш учун
Жумладан: Сальмонеллез, Колибактериоз, Пастереллез.



Флорфеникол орал эритма – 1 мл таркибида 100 мг
флорфеникол антибиотики бўлган антибиотик препарат.

Афзалликлари


- ▶ **10 дақиқада таъсир қилишни бошлайди**
- ▶ **Салмонеллёз, колибактериоз, кушларнинг пастереллёзи**
- учун жуда самарали восита**
- ▶ **Кенг таъсир доираси**
- ▶ **Юқори даражадаги натижа**
- ▶ **Энг хавфсиз антибиотиклардан бири**

Қўлланилиши:


Флорфеникол орал эритма уй паррандалари (товуқлар ва куркалар) даги ошқозон-ичак тракти ва нафас аъзолари турли хил бактериал касалликларини, сурункали оғир касалликларни, уй паррандаларидаги тифларни даволаш учун, шунингдек пуллороз, паратиф, колибактериоз, холера, кампилобактериоз, инфекцияли ринит, ринотрахеит, инфекцияли синовит, омфалитларда қўлланилади

Флорфеникол орал эритма ни паррандаларнинг ичимлик сувига қўшиб бериш йўли билан 1 кг куш вазнига 30 мг флорфеникол нисбатида ёки 1 литр ичимлик сувига 1 мл препарат меъёрида 3-5 кун давомида берилади.

Флорфеникол орал эритма ни тухумидан озиқ-овқат мақсадларида фойдаланиладиган тухум қўювчи товуқларга қўллаш, шунингдек бактерицидли воситалар билан биргаликда қўллаш мумкин эмас.



ТАРКИБИ



100 мг - флорфеникол антибиотики




- 6 сутка



ПНЕВМОМИГ ОР


Орал қўллаш учун эритма



Хайвонлар ва қушлардаги бактериал ва микоплазмали касалликларни даволаш учун қўлланилади

- ▶ Иммуни тизими ҳужайраларида тўпланиши туфайли узоқ вақт ҳимоя қилади
- ▶ Макролидларнинг олдинги авлодларига нисбатан чидамликни енгиб ўтади
- ▶ Микоплазмаларга қарши юқори самарадорликка эга
- ▶ Қаттиқ сувда юқори барқарорликка эга

ТАРКИБИ



250 мг - тилмикозин



парранда - 16 сутка
бузоқлар - 35 сутка

Хайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Дозировкаси ва қўллаш усули
Парранда	Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida томонидан келтириб чиқарилган инфекцияларда, шунингдек аралаш инфекцияларда, вирусли касалликлардаги ва кўзгатувчилари тилмикозинга таъсирчан бўлган хайвонларнинг бошқа касалликларидаги иккиламчи инфекцияларда	3 мл/10 л сув перорал тарзда гурухли усулда 3-5 кун давомида
Бузоқлар	Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Arcanobacterium pyogenes, Micoplasma bovis, Micoplasma dyspar томонидан келтириб чиқарилган респиратор касалликларда, шунингдек аралаш инфекцияларда, вирусли касалликлардаги ва кўзгатувчилари тилмикозинга таъсирчан бўлган хайвонларнинг бошқа касалликларидаги иккиламчи инфекцияларда	0,5 мл/10 кг тана вазнига, кетма-кет 3-5 кун давомида кунига 2 марта сув билан ёки сут ўрнини босувчи билан



ОКСИФУРОВИТ (W.S.P)

ҲАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ГИПОВИТАМИНОЗИНИ
ДАВОЛАШ УЧУН



Оксифуравита W.S.P. (Oxyfuravita W.S.P.) - бу антибиотиклар, витаминлар ва керакли аминокислоталар мажмуасидан иборат препарат.

ТАРКИБИ



1 мг препарат таркибига қуйидагилар киради:	
Окситетрациклин HCL	20 000 мг
Фуралтадон HCL	20 000 мг
А витамини	400 000 МЕ
D3 витамини	70 000 МЕ
Е витамини	100 МЕ
К3 витамини	100 мг
B2 витамини	250 мг
B12 витамини	250 мг
С витамини	335 мг
D-Кальций Пантотенат	500 мг
Никотин кислотаси	1 300 мг
DL-Метионин	2 500 мг
L-Лизин	4 500 мг

Препарат таркибидagi окситетрациклин ва фуралтадон таркибий қисмлари *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.* ва бошқа бактерияларга қарши фаолдир.

Витаминлар комплекси ўсишни рағбатлантиради, рациондаги озуқа моддаларининг етишмаслигини қоплайди, нспецифик иммунитетни кучайтиради, ҳайвонлар ва қушларнинг маҳсулдорлиги ва хавфсизлигини оширади.

Оксифуравита W.S.P. окситетрациклин ва фуралтадонга сезгир қўзғатувчилар келтириб чиқарадиган ҳайвонлар ва паррандаларнинг бактериал касалликларини даволаш учун ишлатилади.

Оксифуравита W.S.P. қуйидаги дозаларда оғиз орқали берилади:

- ▶ бузоқлар, қўзилар ва кучукларга кетма-кет 3-5 кун давомида кунига 2-3 марта, 1 кг ҳайвон вазнига 200 мг миқдорида;
- ▶ уй паррандаларига кунига 2-3 марта, кетма-кет 3-5 кун давомида 1 кг парранда вазнига 500 мг миқдорида.

Антибиотик ва Витамин-минераллар уйғунлиги !



- 6 сутка




ОКСИНЕОВИТ (W.S.P.)

ҲАЙВОНЛАР ВА ПАРРАНДАЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ГИПОВИТАМИНОЗЛАРИНИ
ДАВОЛАШ УЧУН ОКСИНЕОВИТ W.S.P. (КУКУН)



Оксинеовит W.S.P. (Oxycineovit W.S.P.) - бу витаминлар ва антибиотиклар комплексидан иборат препарат.

ТАРКИБИ



1 мг препарат таркибига қуйдагилар кирази:	
Окситетрациклин Гидрохлорид	10 000 мг
Неомицин Сульфат	7 000 мг
А витамини	200 000 МЕ
D3 витамини	40 000 МЕ
Е витамини	60 МЕ
К3 витамини	80 мг
В1 витамини	200 мг
В2 витамини	320 мг
В6 витамини	400 мг
Биотин	10 мг
В12 витамини	840 мкг
Никотинамид	1 600 мг
Пантотен кислотаси	600 мг

Препарат таркибидаги окситетрациклин ва неомицин антибиотиклари *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.* ва бошқа бактерияларга қарши фаолдир

Витаминлар комплекси ўсишни рағбатлантиради, рациондаги озуқа моддаларининг етишмаслигини қоплайди, нонспецифик иммунитетни кучайтиради, ҳайвонлар ва қушларнинг маҳсулдорлиги ва хавфсизлигини оширади.

Оксинеовит W.S.P. окситетрациклин ва неомицинга сезгир қўзғатувчилар ва гиповитаминозлар келтириб чиқарадиган ҳайвонлар ва паррандаларнинг бактериал касалликларини даволаш учун ишлатилади.

Оксинеовит W.S.P. қуйдаги дозаларда оғиз орқали берилади:

- ▶ бузоқлар, қўзилар ва кучукларга кетма-кет 3-5 кун давомида қунига 2-3 марта, 1 кг ҳайвон вазнига 200 мг миқдорида;
- ▶ уй паррандаларига қунига 2-3 марта, 1 кг парранда вазнига 500 мг миқдорида ёки 1 л сувга 1 г миқдорида кетма-кет 3-5 кун давомида.

Антибиотик ва витаминлар бир таркибда!



- 6 сутка




АМПИВИТ (w.s.p) ҲАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА ГИПОВИТАМИНОЗЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН АМПИВИТ (КУКУН)



Ампивит (Ampivit) - антибактериал воситалар ва витаминлар мажмуасидан иборат дори.

ТАРКИБИ



1 мг препарат таркибига қуйидагилар киради:	
Ампициллин тригидрати	15 г
Триметоприм	15 г
А витамини	5 000 000 МЕ
D3 витамини	600 000 МЕ
Е витамини	10 г
K3 витамини	2 г
B1 витамини	2 г
B2 витамини	2 г
B6 витамини	2 г
B12 витамини	5 мг
С витамини	10 г
Кальций Пантотенат	5 г
Никотинамид	15 г

Ампициллин бензил пенициллин таъсир қиладиган грамижобий микроорганизмларга қарши фаолдир. Бундан ташқари, у бир қатор грамсалбий микроорганизмларга таъсир қилади (салмонелла, шигелла, протей, ичак таёқчаси, клебсиелла) ва шунинг учун кенг спектри антибиотик сифатида қаралади.

Триметоприм, шунингдек, E. coli ва Klebsiella, Proteus ва Staphylococcus нинг баъзи турларини ўз ичига олган кенг диапазондаги микроорганизмларга қарши фаолдир.

Витаминлар мажмуаси ўсишни рағбатлантиради, рациондаги озукавий моддаларнинг етишмаслигини қоплайди, носпециффик иммунитетни кучайтиради ва ҳайвонлар ва қушларнинг соғайиш жараёнига ёрдам беради.

Триметопримни янги, қўш таркибли кўриниши: Триметоприм + Ампициллин

Ампивит қуйидаги дозаларда оғиз орқали юборилади:

- ▶ бузоқлар ва тойларга кунига 15-25 г дан, кетма-кет 3-5 кун давомида;
- ▶ қўй ва эчкиларга - кунига 5-15 г, кетма-кет 3-4 кун давомида;
- ▶ уй паррандаларига 100 г препарат 100 литр ичимлик суви билан аралаштирилади (жўжалар учун 100 г препарат 150-200 литр ичимлик суви билан аралаштирилади), ҳар куни 3-5 кун давомида ичирилади.

Профилактика учун 2-3 кун давомида дозанинг фақат ярмидан фойдаланилади. Тавсия этилган дозаларда у ноҳўя таъсирларни келтириб чиқармайди.

- ▶ Бактериялар билан курашда енгил ечим!
- ▶ Икки хил, мукамал таркиб!



- 6 сутка




ТИЛОЗИН 5%

ҲАЙВОНЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ
ДАВОЛАШ УЧУН ТИЛОЗИН 5% (ИНЪЕКЦИЯЛИ ЭРИТМА)



Тилозин 5% инъекцияли эритмаси (Tylosin injection 5%)
- бу 1 мл да 50 мг (50000 МЕ) тилозин тартрат ва ёрдамчи
компонентларни фаол моддалар сифатида ўз ичига олган
препарат.

ТАРКИБИ



= 50 мг - тилозин



- 8 сутка



- 3 сутка

Тилозин 5% инъекцияли эритмаси (Tylosin injection 5%) - бу 1 мл да 50 мг (50000 ИЕ) тилозин тартрат ва ёрдамчи компонентларни фаол моддалар сифатида ўз ичига олган препарат.

Тилозин - бу *Streptomyces fradia*-дан олинган макролидлар гуруҳидаги антибиотик, аксарият грамижобий ва баъзи грамсалбий микроорганизмлар, микоплазмалар, кокклар, коринебактериялар, клостридийлар, эризипелотрикслар, пастуреллалар, вибрионлар, лептоспиралар, бруцеллалар, нейссериялар, риккетсиялар, гемофлюслар ва бошқаларга нисбатан фаол.

Мушак ичига юборилганда у тананинг тўқима ва суюқликларига яхши кириб боради, тез сўрилади ва 1 соат охирида қон зардобиди максимал даражага этади.

Бир марта юборилгандан сўнг, тилозиннинг терапевтик концентрацияси танада 24 соат давомида сақланиб қолади.

Тилозин 5% инъекция эритмаси:

- ▶ нафас олиш йўллари касалликлари (ларинит ларингит, бронхит, трахеобронхит, пневмония ва бошқалар), жарроҳлик инфекциялари, отитлар медиа, некротик иододерматит, микоплазма артритлари, лептоспироз ва бошқалар билан касалланган йирик ва майда қорамоллар, отлар, қуёнлар, итлар ва мушукларни;
- ▶ юқумли ағалактия билан касалланган қўйлар ва эчкиларни даволаш учун қўлланилади.
Препарат мушак ичига фақат қуйидаги дозаларда киритилади:
- ▶ йирик қорамоллар ва отларга, ҳайвонларнинг 1 кг вазнига 5 мг тилозин асоси бўйича, бу 1 кг учун 0,1 мл препаратга тўғри келади, бир марта;
- ▶ майда қорамолларга, қунига 1 марта ҳайвон вазнига 5-6 мг тилозин (1 кг га 0,1-0,12 мл препарат) асоси бўйича ёки 1 кг ҳайвон вазнига 10-12 мг тилозин асоси бўйича (0,1 кг учун 2-0,24 мл препарат) қунига бир марта.
- ▶ итлар ва мушукларга 1 кг ҳайвон вазнига 2-10 мг тилозин асоси бўйича (1 кг учун 0,04-0,2 мл препарат);
- ▶ қуёнларга ҳайвоннинг 1 кг вазнига 12-15 мг тилозин асоси бўйича (1 кг га 0,24-0,3 мл препарат) бир марта.



**Инъекцион макролид антибиотиклари ичида
энг кўп талаб қилинадиган препарат!**




ТИЛОЗИН 20%

ҲАЙВОНЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРИНИ
ДАВОЛАШ УЧУН ТИЛОЗИН 20% (ИНЪЕКЦИЯЛИ ЭРИТМА)



Тилозин 29% инъекцияли эритмаси (Tylosin injection 20%)
- бу 1 мл да 200 мг тилозин тартрат ва ёрдамчи
компонентларни фаол моддалар сифатида ўз ичига
олган препарат.

ТАРКИБИ



200 мг - тилозин



- 8 сутка



- 3 сутка

Тилозин - макролидлар гуруҳидаги антибиотик, аксарият грамижобий бактериялар ва баъзи грамсалбий кокклар, спирохеталар, актиномицетлар, микоплазмаларга нисбатан фаол.

Мушак ичига юборилганда у тананинг тўқима ва суюқликларига яхши кириб боради.

Тез таъсир: 1 соат давомида.

Бир марта юборилгандан сўнг, тилозиннинг терапевтик концентрацияси танада 24 соат давомида сақланиб қолади.

Тилозин 20% инъекцияли эритмаси йирик ва майда қорамоллар, қўйлар ва эчкилар, итлар ва мушукларнинг вирусли касалликлари ва бошқаларида пневмония, метритлар, дифтерия, ичак касалликлари, жараҳатли инфекциялар, иккиламчи бактериал инфекцияларни даволашда қўлланилади;

Препарат мушак ичига фақат қуйидаги дозаларда киритилади:

- ▶ йирик қорамоллар ва отларга, ҳайвонларнинг 50 кг вазнига қунига 1,5-2,5 мл;
- ▶ қўйлар ва эчкиларга ҳайвоннинг 50 кг вазнига 1,0-3,0 мл қунига бир марта.
- ▶ итлар ва мушукларга 10 кг ҳайвон вазнига 0,1-0,5 мл қунига бир марта.

Даволаш муддати 3-5 кун. Қайта юборилганда инъекциялар жойини алмаштириш керак



**Инъекцион макролид антибиотиклари ичида
энг кўп талаб қилинадиган препарат!**



БОЗОРДАГИ
ЕТАКЧИ
ПРЕПАРАТ




ОКСИТЕТРАЦИКЛИН 20% ИНЪЕКЦИЯСИ



Окситетрациклин LA бронхопневмония, юқумли гастроэнтеритни даволаш учун ишлатилади; пастереллёз, колибактериоз, сальмонеллёз, туёқ чириши, хламидиоз, микоплазмозни даволаш ва олдини олиш учун. Бактериал этиологиянинг яллиғланиш жараёнларида (метритлар, маститлар, туғруқдан кейинги ва ярали инфекцияларининг олдини олиш учун қўлланилинади.

- ▶ Юқори сифатга эришиш имконини берувчи патентланган ишлаб чиқариш
 - ▶ технологияси
 - ▶ Узайтирилган таъсири 72 соат, даволаш курси – 1 та инъекция
- Ветеринария соҳаси профессионалларининг ишончи

ТАРКИБИ



200 мг окситетрациклин



21 кун



7 кун

Битта дозани юбориш 3-4 кун давомида қон плазмасида самарали концентрацияни таъминлайди, бу кўп ҳолларда даволаш курсини ўтказиш учун етарли ҳисобланади

Ҳайвон тури	Қўлландиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
ЙШХ МШХ	Окситетрациклинга таъсирчан микроорганизмлар томонидан келтириб чиқарилган касалликлар	чуқур м/и	1 мл/10 кг	Бир марта, зарурат бўлганида 60 соатдан кейин такрорлаш керак



**Мушак ичига юборилганда
шишиш хосил қилмайди**



ЭНРОФЛОКСАЦИН 10% ИНЪЕКЦИЯ

ҲАЙВОНЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ УЧУН.



Enrofloxacin 10% Injection бу 1 мл таркибидаги
100 мг ва ёрдамчи компонентларни ўз ичига олган
антибактериал препарат.

Препарат таркибига кирувчи фторхинолонлар гуруҳига киради ва антибактериал ва антимиоплазмали таъсирнинг кенг спектрига эга, грамижобий ва грамсалбий бактерияларга, шу жумладан *E. Coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.* ва бошқалар, шунингдек *Mycoplasma spp.* га нисбатан фаол.

Препарат бузоқларда, катта ёшли қорамолларда, қўйларда, эчкиларда сезгир микроорганизмлар келтириб чиқарадиган ошқозон-ичак тракти, нафас олиш йўллари ва сийдик йўллари касалликларини, шунингдек вирусли инфекцияларда иккиламчи бактериал касалликларни (масалан, вирусли пневмония), кўп факторли касалликларни (атрофик ринит) даволаш учун ишлатилади.


Препарат мушак ичига қуйидаги дозада юборилади:

- ▶ бузоқлар, катта ёшли қорамоллар, қўйлар, эчкиларга ҳайвонларнинг 10-20 кг вазнига 1 мл миқдорида;
- ▶ итлар ва мушукларга 20-40 кг ҳайвон вазнига 1 мл.

Даволаш курси 3-5 кун.

Бузоқлар, катта ёшли йирик қорамоллар, қўйлар ва эчкиларни 21 кундан кейин сўйишга рухсат берилади. Сутдан озиқ-овқат мақсадида фойдаланишга препарат охириги марта ишлатилганидан кейин 4 кун ўтгач рухсат берилади.

ТАРКИБИ



= 100 мг энрофлоксацин



21 кун



4 кун



Цефтиофур

Инъекция учун суспензия



Ceftiofur® in'ektsiya - сефалоспоринлар гуруҳидаги учинчи авлод антибактериал дори воситаси, хайвонларда бактериал касалликлар ва йирик шохли молларда - ўткир эндометритни даволаш учун қўлланилади.

- ▶ Маститларни даволашнинг тасдиқланган самарадорлиги
- ▶ 1-2 соатдан кейин тез максимал концентрацияга эришилиши
- ▶ Қулай дозировка. Битта инъекция – бир марта ишлов бериш

ТАРКИБИ



50 мг цефтиофур



8 сутка

Касаллик	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
Нафас олиш органларининг касалликлари, некробактериоз ва цефтиофурга таъсирчан микроорганизмлар томонидан келтириб чиқарилган акушерлик-гинекологик касалликлар	т/о	1 мл/50 кг	Респиратор инфекцияларда 3-5 кун, некробактериозда 3 кун, эндометритда 5 кун



Сут бўйича чекловларсиз



ДОКСИЖЕНТА (W.S.P)

ЖОНИВОР ХАМДА ПАРРАНДАЛАРДАГИ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРГА ҚАРШИ, ИККИ ХИЛ ТАРКИБЛИ,
КУКУН ШАКЛИДАГИ ДОРИ ВОСИТАСИ.



Дори воситаси таркибига кирувчи доксициклин ва гентамицин, синергик таъсир қилиб, микробларга қарши таъсирни кучайтиради ва дори воситасининг фаоллик доирасини кенгайтиради. Таъсир этувчи моддалар уйғунлиги грамманфий (*Escherichiacoli*, *Enterobacterspp.*, *Klebsiellaspp.*, *Salmonellaspp.*, *Proteusspp.*, *Campylobacterspp.*, *Pseudomonasaeruginosa*, *Bordetellaspp.*, *Pasteurellasp.*, *Haemophilusspp.*, *Actinobacilluspp.*, *Brucella spp.*, *Treponema hyodysenteriae*) ва грам мусбат бактерияларга (*Clostridium spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, шу жумладан бета-лактамаза ҳосил қилувчи), микоплазма, уреоплазма ва хламидияларга нисбатан ўта фаол.

Дори воситасининг қондаги максимал концентрациясига қўлланилгандан кейин 1,5 - 2 соат ўтгач эришилади ва 6 соат давомида сақланади, терапевтик концентрацияси эса 24 соат давомида сақланади.

Дори воситасини қишлоқ хўжалик паррандаларининг колибактериоз, пастереллез, сальмонеллез, стрептококкоз, микоплазмоз, сурункали респиратор касалликлари (СРК), некротик энтерит; жониворларнинг юқумли атрофик ринит ва дизентериясида; шунингдек дори воситаси компонентларига таъсирчан қўзғатувчилар томонидан чақирилган бактериал этиологиядаги бошқа инфекцияларини даволаш учун қўлланилади.

Дори воситасини ичга 3-5 кун давомида қуйидаги дозаларда қабул қилинади:

- ▶ ЙШХ ва МШХ ларда – индивидуал равишда 10 кг ҳайвон массасига 0,5 мг дан озроқ миқдордаги ем ёки сув билан 1гр препаратни 2 литр ичимлик суви билан аралаштириб берилади, дизентерияни даволашда доза 10 кг ҳайвон массасига 1 мг гача оширилади.
- ▶ Гуруҳ усулида - 0,5-1 гр дори воситасини бир тонна ичимлик сувига қўшиб берилади; Қишлоқ хўжалик паррандаларига - 0,5-1 гр дан бир тонна ичимлик сувига.


Паррандалардаги аралаш инфекциялар, шунингдек касалликнинг сурункали шаклларида даволаш курси етти кунгача узайтирилади.

Ҳайвонларга даволаш даврида фақат таркибида дори воситаси мавжуд бўлган сув берилади.

Дори воситасининг тайёр эритмаси 24 соат давомида ишлатилиши зарур.

Дори воситасини тухуми истеъмол қилинадиган паррандаларга бериш таъқиқланади.

ТАРКИБИ



100 мг доксициклин
100 мг гентамицин



8 - сутка



ТИЛОЖАТ (W.S.P)

ТИЛОЗИН 99,8%

ЖОНИВОРЛАРДАГИ МИКОПЛАЗМОЗЛАРНИ
ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ.



Қўлланилиши.

Тилозин – макролидлар гуруҳига мансуб антибиотик бўлиб, *Streptomyces fradiae* shtamm томонидан ишлаб чиқарилган, жўжалар ва курка болаларидаги кўпгина граммусбат ва грамманфий бактерияларга нисбатан бактериястатик таъсирга эга бўлиб *Mycoplasma gallisepticum* га қарши кучли фаоллик кўрсатади. Шунинг учун ушбу препарат жўжалар ва курка болаларидаги микоплазмозларни даволаш ва профилактика қилишда фойдаланилади.

Тиложатни - оғиз орқали сув билан аралаштирилган ҳолда 2 литр ичимлик сувига 1 гр препарат меъёрида 3-5 кун давомида берилади.

Клиник соғайиб кетгандан сўнг препаратни 24 соат давомида бериб турилиши лозим.

Бошқа макролидли антибиотиклар каби ушбу препаратни ҳам фениколлар ва линкосамидлар билан биргаликда қўллаш мумкин эмас.

Препаратни тухуми озиқ-овқат мақсадларида қўлланиладиган товуқлар учун қўллаш мумкин эмас.

Сувга аралаштирилган препаратни 3 кундан ортиқ бериш мумкин эмас.

ТАРКИБИ



Респиратор микоплазмозда - самарали восита

- ▶ юқори даражадаги кенг қамровли
- ▶ тез сўрилади (қўллангандан кейин керакли терапевтик концентрацияга 1-3 соатда еришилади)
- ▶ овқат ҳазм қилишни яхшилашга ёрдам беради
- ▶ ичак эпителиясини тезда тиклашга ёрдам беради
- ▶ қушнинг танасига узоқ муддатли таъсир кўрсатади (18 соатгача)



МОНТАМОКС (w.s.p)
АНТИБАКТЕРИАЛ ПРЕПАРАТ БЎЛИБ
ПАРРАНДАЛАРДАГИ БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРНИ
ДАВОЛАШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ.



Монтамокс қушлардаги колибактериозни (*Escherichia coli.*), тифларни, пуллороз (*Salmonella gallinarum, S.pullorum*), қушларга холера (*Pasteurella multocida*), некротик энтерит (*Pasteurella multocida*), паратифозли инфекциялар (*Salmonella enteritidis, S.typhimurium*) ни даволаш учун қўлланилади.

Препарат уй паррандаларига оғиз орқали ичимлик суви билан биргаликда ҳар куни 2 литр ичимлик сувига 1 г меъёрида 3-5 кун давомида қўлланилади.

Таркибида препарат бўлган ичимлик сувини 24 соат давомида қўлланилиши лозим.

Препаратни қўллашга монеликлар:

Резистентли микроорганизмлар шунингдек, пеницилиназа ишлаб чиқарувчи стафилококклар келтириб чиқарган инфекцияларни даволашда қўллаш мумкин эмас.

Тухуми озик-овқат мақсадида фойдаланиладиган тухум қўювчи товукларга препаратни қўллаш мумкин эмас.

Бошқа препаратлар билан номутаносиблиги.

Препаратни тетратциклинлар, макролидлар ва линкосамидлар каби бошқа антибиотиклар билан биргаликда қўллаш мумкин эмас.

Уй паррандаларини гўшт учун сўйишга препарат охириги марта қўлланилганидан кейин 7 кун ўтганидан сўнг рухсат этилади.

ТАРКИБИ



— Амоксициллин тригидрат - 200 мг
— Колистин сульфат - 800 000 МЕ



7 сутка



ҚЎШ ТАРКИБЛИ АНТИБАКТЕРИАЛ ПРЕПАРАТЛАР
ИЧИДА ЯНГИ, ЎЗИГА ХОС ЁНДОШУВ!



ФЛОРЖАТ-10

ҚУШЛАРДАГИ БАКТЕРИАЛ КАСАЛЛИКЛАРНИ
ДАВОЛАШ УЧУН



Қўлланилиши

Флоржат-10 паррандалари (товуқлар ва куркалар) даги ошқозон-ичак тракти ва нафас аъзолари турли хил бактериал касалликларини, сурункали оғир касалликларни, уй паррандаларидаги тифларни даволаш учун, шунингдек пуллороз, паратиф, колибактериоз, холера, кампилобактериоз, инфекцияли ринит, ринотрахеит, инфекцияли синовит, омфалитларда қўлланилади

Флоржат-10 ни паррандаларнинг сувга қўшиб бериш йўли билан 1 кг қуш вазнига 30 мг флорфеникол нисбатида ёки 1 литр ичимлик сувига 1 мл препарат меъёрида 3-5 кун давомида берилади.

Эхтиёткорлик ва огохлантириш. Флоржат-10 ни тухумидан озиқ-овқат мақсадларида фойдаланиладиган тухум қўювчи товуқларга қўллаш, шунингдек бактерицидли воситалар билан биргаликда қўллаш мумкин эмас.

Кутиш даври.

Қушларни гўшт учун сўйишга препарат охириги марта қўлланилганидан кейин 4 кун ўтганидан сўнг рухсат этилади.

- ▶ Антибактериал таъсирнинг кенг спектри.
- ▶ Препарат кичик концентрацияларда ҳам юқори самарали.
- ▶ Сувда тез ва яхши эрувчанлик (чўкма хосил қилмайди)
- ▶ Антибиотиклар ичида энг хавфсизлардан бири

ТАРКИБИ

 = 100 мг флорфеникол  - 4 сутка



СКОУР СТОП

БАКТЕРИАЛ ДИАРЕЯНИНГ ОЛДИНИ
ОЛИШ ВА ДАВОЛАШ УЧУН.

ТОЙЛАРДА, БУЗОҚЛАРДА, ҚЎЗИЛАРДА, ЭЧКИ БОЛАЛАРИДА
ВА КУЧУКЛАРДАГИ КОЛИБАКТЕРИОЗНИ ДАВОЛАШ
ВА ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН САМАРАЛИ ВОСИТА!



- ▶ Ўзбекистон бозорида илк бор
- ▶ Жаҳон стандартлари бўйича
- ▶ Кенг қамровли дори воситаси
- ▶ Гастроэнтерит ва пневмонияни комплекси даволаш
- ▶ Электролитлар йўқотилишини тиклаш ва ичак ҳаракатининг сустлашиши даволаш ва олдини олиш

ТАРКИБИ



1 мл таркибида:	
неомицин сульфат	54 мг
сульфадимидин	1065 мг
сульфадиазин	1065 мг
стрептомицин (сульфат стрептомицин)	182 мг
гиосцина (гиосцина гидробромид)	0,95 мг
кальций (глюконата кальций)	5,9 мг
калий (хлорида калий)	57 мг
магний (Сульфат магний)	1,77 мг
натрий (в виде хлорида натрия)	133 мг
Глицин	627 мг
Пектин	159,6 мг
Каолиновая глина	3,1 г

Қўллаш усули 3-5 кун давомида кейинги дозада кунига 2 марта

- ▶ қўзилар, итлар ва мушукларда: 2 мл / 3кг тана оғирлиги.
- ▶ той ва бузоқларда: 30 мл / 25 кг тана оғирлигига Салмонеллёз ва бактериал пневмонияда даволанишни камида 5 кун давом етиринг.



PENSTREP V

ИНЪЕКЦИЯ УЧУН СУСПЕНЗИЯ
ҲАЙВОНЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ДАВОЛАШ
УЧУН ДОРИ ВОСИТАСИ



- 200,000 ХБ - новокаин пенициллин
- 200.0 мг/мл дигидрострептомицин сульфат

Қўллаш тартиби

PENSTREP V йирик шохли моллар, қўй, эчкиларда артритлар, маститлар, гастроэнтеритлар, пенициллин ва дигидрострептомицинга таъсирчан микроорганизмлар, жумладан *Campylobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *E. coli*, *Erysipelothrix*, *Haemophilus*, *Klebsiella*, *Listeria*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Staphylococcus* ва *Streptococcus* spp. лар томонидан қўзғатилган респиратор ва сийдик йўллари касалликларини даволаш учун қўлланилади.

Дори воситаси мушак орасига қуйидаги дозаларда юборилади:

- ▶ йирик шохли молларга: 20 кг ҳайвон вазнига 1,0 мл дан 3 кун давомида;
- ▶ бузоқ, қўй, эчкиларга: 10 кг ҳайвон вазнига 1,0 мл дан 3 кун давомида.

Битта жойга - йирик шохли молларга 20,0 мл, бузоқ, қўй ва эчкиларга 5,0 мл дан ортиқ юборишга йўл қўйилмайди.

Фойдаланишдан аввал дори воситасили флакон яхшилаб чайқатилади.

Фақат мушак орасига қўлланилади!

Бошқа нефротоксик дори воситалари ёки умумий оғриқсизлантирувчи препаратлар билан биргаликда қўлланилмайди. Бўғоз ҳайвонларга таҳдид бўлмаган муддатларида қўлланилади.



ХИТ



Монтоцин (инъексияси)

Инъекциялар учун эритма



Таркиби:

Монтоцин инъексияси (Montotsin injection) – гормонал препарат бўлиб ҳар 1 мл да 10 МЕ окситацин, мавжуд.

Монтоцин инъексияси урғочи хайвонларда туғруқ жараёнида бачадон бўйини очилган бўлса бачадон мускулларининг қисқариш интенсивлигини оширишда, туғруқдан кейин бачадон инволюциясида, йўлдош ажралиши тўхтаб қолганда қон кетишнинг олдини олишда, шунингдек туғруқдан кейин сут бўлмаганда лактацияни оширишда қўлланилади.

Препаратни мускул орасига чуқур инъексия қилиш йўли билан қуйидаги меъёрларда юборилади:

- ▶ сигирларга, бир хайвонга 1- 4 мл (10-40 МЕ) меъёрида, бир марта;
 - ▶ она қўй ва эчкиларга, бир хайвонга 0,2-1 мл (2-10 МЕ) меъёрида, бир марта;
 - ▶ бия (урғочи от) ларга, бир хайвонга 1-4 мл (10-40 МЕ) меъёрида, бир марта;
 - ▶ урғочи итларга, бир хайвонга 0,2-1 мл (2-10 МЕ) меъёрида, бир марта;
 - ▶ мушукларга, бир хайвонга 0,2-0,5 мл (2-5 МЕ) меъёрида, бир марта.
- Вена томирига юбориш учун 1 мл препаратни 10 мл инъексия учун сувга аралаштирилади.

Тайёр бўлган эритмани қуйидаги меъёрларда секин-асталик билан юборилади:

- ▶ сигирларга, бир хайвонга 2,5-10 мл (2,5-10 МЕ) меъёрида, бир марта;
- ▶ она қўй ва эчкиларга, бир хайвонга 0,5-2,5 мл (0,5-2,5 МЕ) меъёрида, бир марта;
- ▶ бия (урғочи от) ларга, бир хайвонга 2,5-10 мл (2,5-10 МЕ) меъёрида, бир марта;
- ▶ урғочи итларга, бир хайвонга 0,5-2,5 мл (0,5-2,5 МЕ) меъёрида, бир марта;
- ▶ мушукларга, бир хайвонга 0,5-2,5 мл (0,5-1,25 МЕ) меъёрида, бир марта.

Ножўя таъсирлари. Препаратни юқори меъёрларда юборилганда бачадоннинг ҳаддан ташқари қисқаришига ва ёрилишига, хомила шикастланишига, шунингдек ўлик туғилишига олиб келиши мумкин.

Препаратни юрак-қон-томир тизимида муаммоси бўлган хайвонларга, гипогликемия ва гипокалсемия ҳолатларида, шунингдек инсулин ва глюкагон инъексиялари билан бир вақтнинг ўзида қўллаш мумкин эмас.

1 мл
МОНТАЦИН

= 10 МЕ окситацин



- 7 сутка



ЭСТРАДИОЛ БЕНЗОАНАТ ИНЪЕКЦИЯСИ

ЭСТРОДИОЛ БЕНЗОНАТ (C₂₅H₂₈O₃)
ТАРКИБИ БЕЛГИЛАНГАН МИҚДОРНИНГ
90,0% ДАН 110,0% ГАЧА.



Эстродиол бензонат - бу простагландин ф2-альфа синтетик аналогидир, у урғочиларда жинсий циклнинг лютеаль босқичида сариқ тана регрессиясини келтириб чиқаради ва фолликулларнинг ўсиши ва ривожланишига ёрдам беради.

Сигирлар/ғунажинлар учун: - қийин туғиш пайтида тўлғоқни кучайтириш:

- ▶ бачадон инволюциясини тезлаштириш;
- ▶ йўлдошни ушлаб туриш;
- ▶ антибактериаль воситалар билан биргаликда эндометрит терапияси;

Байталларга: эструсни рағбатлантириш ва персистентли сариқ тананинг регрессияси учун.

Урғочи ит, мушукларга: сурункали эндометритлар ёки исталмаган ҳомиладорликни тўхтатиш бўйича комплекс терапия учун препаратлар таркибида.

Барча турдаги урғочилар учун Эстрадиол Бензонат мушак ичига ёки тери остига юборилади.

Сигирлар, ғунажинлар:

- ▶ туғиш асоратларида - 400 кг тана вазнига 2 мл. Ҳар 50 кг каттароқ (кичикроқ) масса учун доза 0,3 мл га ошади (камаяди).
- ▶ тухумдонларнинг функционал бузилиши билан - уруғлантиришнинг керакли вақтидан 3-3,5 кун олдин 2 мл. Куйиқиш белгилари бўлмаса, препарат биринчи инъекциядан сўнг 11-кун қайта қўлланилади. 3-3,5 кундан сўнг, куйиқиш белгиларидан қатъи назар, икки марта уруғлантириш амалга оширилади.

Совлиқ қўй - 0,5-0,7 мл.

Байталлар - 1 мл. қочириш учун энг қулай вақт юборилгандан 4-6 кун ўтгач юз.

Урғочи итлар - 0,2 - 0,3 мл.

Мушуклар - 0,1 мл, абортни чақириш учун, а 12 соат оралиқ билан 3-5 шундай инъекция талаб қилинади.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар: Ҳомиладорликнинг учдан бир қисмида урғочиларга юборилганда, аборт эҳтимоли катта бўлади.

Эҳтиёт чоралари: препарат киритилгандан сўнг, биринчи соғишдан олинган барча сут фақат ҳайвонларни боқиш учун ишлатилади.



ВИТАЛАЙТ-V (W.S.P)

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАЙВОНЛАРИ ВА ҚУШЛАРИ
УЧУН ВИТАЛАЙТ-V (СУВДА ЭРУВЧАН КУНУН)



Виталайт-V (Vitalyte-V) - бу витаминлар, минераллар
ва керакли аминокислоталар мажмуасидан иборат препарат.

1 мг препарат таркибига қуйидагилар киради:

A витамини	15 000 000 МЕ	Калий Хлорид	87 000 мг
D3 витамини	4 400 000 МЕ	Натрий Сульфат	212 000 мг
E витамини	1 350 МЕ	Натрий Хлорид	50 000 мг
K3 витамини	4 350 мг	Магний Сульфат	12 000 мг
B2 витамини	4 350 мг	Мис Сульфат	12 000 мг
B6 витамини	2 350 мг	Рух Сульфат	12 000 мг
B12 витамини	11 350 мкг	Марганец Сульфат	12 000 мг
C витамини	1 000 мг	Лизин Гидрохлорид	15 000 мг
Никотиномид	16 700 мг	Метионин	10 000 мг
Кальций Пантотенат	5 350 мг		

Препарат комплекс умумий тикловчи ва стрессга қарши таъсирга эга, шунингдек, озуканинг ҳазм бўлишини ошириш ва паррандаларнинг маҳсулдорлигини кучайтиришга ёрдам беради.

Виталайт-V моддалар алмашуви бузилишининг олдини олиш, парранда рационини бойитиш ва мувозанатлаш учун ишлатилади.

Босқичли аралаштириш ускуналари ёрдамида ёки ичимлик сувига қуйидаги дозаларда озукка қўшилади:

- ▶ бройлерлар учун 1 литр ичимлик сувига 1 г препарат миқдорида ёки 1 тонна озукка учун кунига 1-2 кг препарат дозасида ем билан 5-7 кун давомида;
- ▶ тухум туғадиган товуқларга бир литр ичимлик сувига 0,5 г ёки бир тонна емга 1-2 кг препарат миқдоридаги суткалик дозасида озукка билан 5-7 кун давомида.

Препарат 1 тонна озукка ёки сувга 1 кг препарат миқдорида қўлланилади.

Тавсия этилган дозаларда у ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди, қўлланилишга қарши кўрсатмалар аниқланмаган.

Препаратни қўллашда паррандани гўшт учун сўйиш ва парранда маҳсулотларини озиқ-овқат мақсадларида фойдаланишга чекловларсиз йўл қўйилади.



**Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ**



ВИТАЛАЙТ OR



(Vitalyte Oral Solution) - бу витаминлар, минераллар ва керакли аминокислоталар мажмуасидан иборат препарат.

1 мг препарат таркибига қуйдагилар киради:

А витамини	15 000 000 МЕ	Калий Хлорид	87 000 мг
D3 витамини	4 400 000 МЕ	Натрий Сульфат	212 000 мг
Е витамини	1 350 МЕ	Натрий Хлорид	50 000 мг
К3 витамини	4 350 мг	Магний Сульфат	12 000 мг
B2 витамини	4 350 мг	Мис Сульфат	12 000 мг
B6 витамини	2 350 мг	Рух Сульфат	12 000 мг
B12 витамини	11 350 мкг	Марганец Сульфат	12 000 мг
С витамини	1 000 мг	Лизин Гидрохлорид	15 000 мг
Никотиномид	16 700 мг	Метионин	10 000 мг
Кальций Пантотенат	5 350 мг		

Препаратни ташкил этадиган витаминлар алмашув жараёнларнинг катализатори ҳисобланади.

Аминокислоталар - бу тўқима оқсиллари, ферментлар, пептид гормонлари ва бошқа биологик фаол бирикмаларнинг таркибий бирликлари.

Препарат комплекс тикловчи ва стрессга қарши таъсирга эга.

Узоқ муддатли қўлланишда у ўсишга, озуқа ҳазм бўлишини яхшилашга, иммунитетни кучайтиришга, маҳсулдорликни оширишга ва паррандаларнинг касаллик ва ўлимни камайтиришга ёрдам беради.

Виталайт оғиз орқали бериладиган эритма паррандаларга ичимлик суви билан қуйидаги дозаларда қўлланилади:

- ▶ бройлер товуқлари ва ўрин тўлдирадиган ёш товуқларга 2-3 литр ичимлик сувига (2-3 тонна учун 1 литр) 1 мл препарат миқдорида 5-7 кун давомида;
- ▶ тухум туғадиган товуқлар учун 1,5-2 литр ичимлик сувига 1 мл (1,5-2 тонна учун 1 литр) 5-7 кун давомида.

Кўрсатмалар бўйича препаратни қўллаш курсини такоррлаш мумкин.

Тавсия этилган дозаларда ишлатилганда препарат ноҳўя таъсирларни келтириб чиқармайди. Фойдаланишга қарши кўрсатмалар аниқланмаган.



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ

Қўллашда қулайлик!



ВИТАБЕСТ (W.S.P)



Витабест W.S.P. (Vitabest W.S.P.) - бу витаминлар, аминокислоталар комплексидан иборат препарат.

1 мг препарат таркибига қуйдагилар киради:

А витамини	10 000 000 МЕ	КЗ витамини	500 мг
D3 витамини	1 000 000 МЕ	Пантотен кислотаси	4 000 мг
B1 витамини	2 000 мг	Никотин кислотаси	6 000 мг
B2 витамини	5 000 мг	Карнитин HCl	3 000 мг
B6 витамини	2 000 мг	Метионин	15 000 мг
С витамини	4 000 мг	Фолий кислотаси	100 мг
Е витамини	3 000 мг	Тўлдиргич	Сувсиз глюкоза q.s.

Препаратни узоқ муддат истеъмол қилиш ўсишни рағбатлантиради, тухум қўйиш муддатини узайтиради ва тухум пўчоғининг сифатини яхшилади, ошқозон-ичак трактининг фаолиятини нормаллаштиради ва диареяни камайтиради, нафас олиш йўллари ва репродуктив тизимнинг носпецифик иммунитетини кучайтиради ва паррандалар касалланишни камайтиради, рационда озуқа моддаларининг етишмаслигини қоплайди.

Витабест W.S.P. препарати паррандалар рационини бойитиш ва мувозанатлаш учун ишлатилади.

Босқичли аралаштириш ускуналари ёрдамида озуқага ёки ичимлик сувиغا қўшилади.

Препарат 1 тонна озуқа ёки сув учун 500 г препарат миқдорида ишлатилади.

Тавсия этилган дозаларда у ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди, қўлланишига қарши кўрсатмалар аниқланмаган.

Препарат қўлланилганда паррандаларни гўшт учун сўйишга ва ва тухумларни озиқ-овқат мақсадларида фойдаланишга чекловларсиз йўл қўйилади.



Чорвачилик маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ



ДЕКСТРИФЕРРОН 10% (Темир) + ВИТАМИН В12

ХАЙВОНЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИНИ
ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ИНЪЕКЦИЯ



Декстриферрон 10%+Витамин В12 Инъекцияли (Dextriferron 10% + Vitamin B12 Injection) – бу 100 мл таркибида 10 г декстриферрон (темир декстран), 2,5 мл В12 витамини ва ёрдамчи қисмларни ўз ичига олган анемияга қарши препарат.

Декстриферрон 10%+Витамин В12 Инъекцияли - бу декстриферрон ва В12 витаминлари мажмуасининг коллоид эритмаси, таркибида темир моддаси юқори бўлган органик инъекция тури.

Бу ёш ҳайвонлар - бузоқлар, тойчалар, қўзилар, улоқчалар, кучуклар ва бошқаларда темир танқислиги анемияси, шу жумладан неонаталь анемия касаллигини олдини олиш ва даволашда жуда самарали.

Уларнинг тирик қолиш даражасини оширади, иммунитетни ва касалликларга чидамлилигини оширади, ўсишга ёрдам беради, стрессни камайтиради, миопатия касаллигини олдини олади; шунингдек, катта ҳайвонларда туғруқдан кейинги, операцион, паразитар ва алиментар анемияни даволашда самарали бўлади.

Жигар ва буйрак функциялари жиддий бузилган тақдирда препаратни қўллаш мумкин эмас.

Препарат инъекцияси вақтинча оғриқни келтириб чиқариши мумкин, шунинг учун уни мушак ичига чуқур киритиш керак.

Ҳайвонларни гўшт учун сўйиш ва уларнинг маҳсулотларини озиқ-овқат мақсадларида ишлатишда чекловлар мавжуд эмас.

- ▶ Жониворлар организмда темир моддасини ўзлаштиришининг икки баравар ошиши.
- ▶ Жониворлар ҳаётининг дастлабки кунда вазн ошишига қўмаклашади.

Қўлланиши вадозалари:

- ▶ бузоқлар ва тойларни 3-5 кунлигида - 4.0-6.0 мл;
- ▶ қўзиларнинг 5-6 кунлигида - 1.0-1.5 мл;
- ▶ итлар ва мўйнали ҳайвонларнинг 3-5 кунлигида - 1.0 мл.

Даволаш мақсадида 2 ҳафтадан катта ёшдаги ҳайвонларда қуйидаги битта дозада (ҳайвон бошига мл) қўлланилади:

- ▶ бузоқлар ва тойлар-6.0-8.0 мл;
- ▶ қўзилар-2.0-3.0 мл;
- ▶ итлар ва мўйнали ҳайвонларнинг болалари-2.0 мл.

Касалликнинг оғир ҳолатларида препарат бир хил дозаларда 10-12 кундан кейин қайта қўлланилади.



Чорвачилик маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ



МУЛЬТИВИТ-V

ҲАЙВОНЛАРДА ГИПОВИТАМИНОЗЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА
ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН МУЛЬТИВИТ-V (ИНЪЕКЦИЯ ЭРИТМАСИ)



Мультивит-V (Multivit-V) – бу витаминлар мажмуасидан
ташkil топган ветеринария препарати.

1 мл препарат таркибига қуйдагилар киради:

A витамини	3 000 ME	B6 витамини	5.0мг
D3 витамини	2 000 ME	B12 витамини	10.0 мг
E витамини	4.0 мг	C витамини	1.0 мг
B1 витамини	10.0 мг	D-Пантотенол	10.0 мг
B2 витамини	1.0 мг	D-Биотин	10.0 мг
B3 витамини	12.5 мг		

Мультивит-V қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида витамин етишмаслиги натижасида келиб чиқадиган, масалан, ўсиш бузилиши, янги туғилган ҳайвонларнинг заифлиги, янги туғилган ҳайвонларнинг камқонлиги, кўриш қобилияти бузилиши, ичак бузилиши, соғайишни тезлаштириш, анорексия (иштаҳанинг йўқлиги), репродукциянинг юқумсиз касалликлари, рахит, мушакларнинг заиф ривожланиши, мушаклар титраши ва юрак етишмовчилиги нафас олиш қийинлишуви ва гижжали инвазиялар (қўллаб-қувватловчи восита сифатида) касалликларни даволаш ва олдини олиш учун мўлжалланган.

Мультивит-V тери остига ёки мушак ичига, 10 кг ҳайвон вазнига 1 мл дозада қўлланилади. Даволаш курси кетма-кет 5 кун.

Тавсия этилган дозаларда у ноҳўя таъсирларни келтириб чиқармайди, фойдаланишга қарши кўрсатмалар йўқ. Мультивит-V препарати қўлланилганда ҳайвонларни сўйиш ва чорвачилик маҳсулотларини озиқ-овқат мақсадларида фойдаланишга чекловларсиз йўл қўйилади.

► Жониворларни турли касалликларга қарши курашишда имун тизими мақомини оширади!



Чорвачилик маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ



БАЛИҚ ҒИ

ВИТАМИНЛАШТИРИЛГАН БАЛИҚ ҒИ



Витаминлаштирилган балиқ ғининг 1 мл таркибига қуйдагилар киради: 2000 МЕ витамин А ва 200МЕ витамин D3.

А ва D3 гиповитаминозлари, рахит, остеомалация, экзема, дерматит, трофик яралар, куйишлар, совуққа олдиришларни олдини олиш ва даволаш, шунингдек, моддалар алмашувини яхшилаб ва самарадорликни ошириб, суяк синишинг битишини тезлаштиради.

Препарат индивидуал ёки гуруҳ усулида танага киритилади. У бевосита ёки қуйдаги дозаларда озуқа билан аралаштирилиб берилади:

- ▶ йирик ва майда қорамоллар - 1 кг тирик вазнига 0,3 мл;
- ▶ мўйнали ҳайвонлар, итлар ва мушуклар – ҳайвон бошига 5-10 мл;
- ▶ товуқлар, ўрдақлар, ғозлар ва курка - 1 кг озуқага 5 мл.

Тери касалликларида жароҳатни даволашини тезлаштириш учун балиқ ғи ташқаридан қўлланилади.

Тавсия этилган дозаларда ва тўғри ишлатилганда ножўя таъсирлар кузатилмайди.

Сўйишдан олдин бройлер товуқлари ва ҳайвонларга қўлламаслик тавсия этилади, чунки препарат маҳсулотга балиқ ҳидини беради.

Чорвачилик ва паррандачилик маҳсулотларидан витаминлаштирилган балиқ ғи қўлланилгандан кейин чекловларсиз фойдаланиш мумкин.



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛРСИЗ



ВИТАМИН - КАЛЬЦИЙ - ФОСФОР АЛМАШИНУВИ РЕГУЛЯТОРИ!



ВИТАМИН D3

ҲАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАР УЧУН ВИТАМИН D3 (МОЙЛИ АРАЛАШМА)

D3 витамини ёғли эритма ҳисобланади



Ҳайвонлардаги гиповитаминозларни даволаш ва уларнинг олдини олиш учун мўлжалланган, стрессли вазиятларда чидамлилиكنи оширувчи препарат

D3 витамини танадаги минерал мувозанатни сақлаш учун зарур бўлган ёғда эрийдиган асосий витамин ҳисобланади.

У қуйидаги функцияларни бажаради: кальций ва фосфорнинг қондаги даражасини тартибга солиш; суяк минерализацияси; ҳужайралар кўпайишини ва уларнинг фарқлаишини назорат қилиш; иммунитет тизимининг модуляцияси.

Препарат D3 гиповитаминози ва уларнинг фонида ривожланаётган касалликларнинг олдини олиш ва даволашда, организмдаги минераллар мувозанати бузилганда, моддалар алмашувини нормаллаштириш ва ҳайвонлар ва қушларнинг маҳсулдорлигини ошириш учун, шунингдек, ветеринария препаратлари ишлаб чиқариш учун субстанция сифатида қўлланилади.

Витамин D3 рахит ва остеомалацияга қарши махсус восита ҳисобланади.

D3 витаминининг дозаси кўп жиҳатдан рационнинг таркибига ва бошқа турли хил параметрларга боғлиқ.

Дозалар ҳайвонлар ва қушларнинг танасининг D3 витаминига бўлган кунлик эҳтиёжидан келиб чиқиб белгиланади.

Йирик қорамол, қўй, эчки, от, қуён ва парранда учун 1 кг тирик вазнига 500 дан 2000 МЕ гача ёки 1 кг тўлиқ рационли ем учун 2000-5000 МЕ га дозалаш бўйича умумий тавсиялар. Ёш жониворларга 1 кг сутга 10000 МЕ қўшилади.

Кунига 1 бош жониворга D3 витаминининг тавсия этилган дозалари:


- ▶ наслдор буқалар - 150 000 - 200,000 МЕ
- ▶ йирик ёш қорамоллар - 3 000 - 7,000 МЕ
- ▶ соғин сигирлар 3,000 - 5,000 МЕ
- ▶ бройлерлар 2,000 - 3,000 МЕ
- ▶ тухум қўядиган товуқлар 2 500 - 3,500 МЕ

Препарат ҳайвонлар ва паррандалар озукасига қўшилади ёки витаминли ва витаминли-минерал озук а аралашмалари таркибига киритилади (премикслар).



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ

**Рахит касаллигини даволаш олдини
олишда ишончли восита!**



Бутофосфан® OR

Перорал қўллаш учун эритма



Тухум пўчоғи ва суякларнинг сифатини яхшилаш учун қишлоқ хўжалик паррандасида кальций-фосфор алмашинувини тартибга солишга мўлжалланган комплекс препарат

- ▶ Тухум пўстлоғининг мўртлиги олдини олади ва парранданинг махсулдорлигини оширади
- ▶ Тухум синишини пасайтиради
- ▶ Кертикларни камайтиради
- ▶ Тухум қўядиган товуқларда суякларнинг паст сифати билан боғлиқ бракка чиқарилишини қисқартиради
- ▶ Парранданинг реабилитация даврини қисқартиради
- ▶ Канибализм (разклёв) дан ишончли химоя

Таркиби



1 мл
БУТОФОСФАН
OR



Бутофосфан - 100мг



Витамин В₁₂ - 0,0725мг



Сут маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ

Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Даволаш курси
Тухум қўядиган товуқлар, бройлерлар	Сақланиш даражаси, махсулдорлиги ва стрессли вазиятларга турғунлигини ошириш учун	Перорал	2-3 мл/1 л ичимлик суви	4-5 кун
Жўжалар ва болалайдиган ёш товуқлар			1-1,5 мл/1 л ичимлик суви	
Бройлер-жўжалар	Хаво ҳароратини кутарилиб кетиши ҳамда намлик даражаси ошиши орқали келиб чиқадиган иссиқлик зарбасини олдини олиш учун.		20 мл/1 л ичимлик суви	



Бутофосфан® инъекция


ҲАЙВОНЛАРДАГИ МОДДА
АЛМАШИНУВИНИ ЯХШИЛАШ
УЧУН ДОРИ ВОСИТАСИ



Чорвачилик маҳсулотларига чекловларсиз, моддалар алмашинувини рағбатлантирувчи юқори самарали дори препарати

- ▶ Тикланиш даврини қисқартиради
- ▶ Яшаш қобилиятини оширади
- ▶ Чорва сонининг маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилади
- ▶ Ёш чорва моллар ва катта ёшли поданинг сақланишини оширади
- ▶ Бепуштлик ва туғруқдан кейинги асоратларнинг олдини олади
- ▶ Кўпайиш қобилиятини оширади

ТАКРИБИ



— Бутафосфан - 100 мг
— Витамин В₁₂ - 0,05 мг




Чорвачилик маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ

Бутофосфан инъекцияси 4-5 кун давомида мушак ичига, тери остига ёки вена ичига (секин) суткада бир марта жадвалда кўрсатилган бир марталик дозаларда қўлланади:

Ҳайвон тури	Дозаси (битта ҳайвонга мл да)
Катта ёшли отлар ва йирик шохли мол	10,0 – 25,0
Тойлар, бузоқлар	5,0 – 12,0
Катта ёшли қўйлар ва эчкилар	2,5 – 8,0
Қўзилар, эчки болалари	1,5 – 2,5
Итлар	0,5 – 5,0
Мушуклар, мўйнали ҳайвонлар	0,5 – 2,5

Касаллик сурункали тарзда кечганида препаратининг жадвалда кўрсатилган дозасининг 1/2 қисми тайинланади. Зарурат туғилганида такрорий даволаш курси 5-14 кунлик танаффуслар билан ўтказилади.



Е-селенит® OR

Перорал қўллаш учун эритма



Хайвонлар ва паррандалар организмда Е витамини ва селен моддаси танқислиги туфайли келиб чиққан касалликларни даволаш ва уларнинг олдини олиш учун орал эритма шаклидаги дори препарати

- Яққол намоён бўладиган антиоксидант таъсир
- Қўшимча вазн ва ёш чорваларни ривожланиб чиқишининг ошиши
- Иммуитетни рағбатлантирувчи, стрессга қарши ва антитоксик таъсир
- Паст дозаларда юқори самарадорлик

ТАРКИБИ

1 мл
Е-СЕЛЕНИТ
OR

== Селен(натрий селенит шаклида) - 0,5 мг
== Витамин Е - 50мг



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛРСИЗ

Хайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
Жўжалар, бир суткалик ёшдан бошлаб	Профилактика	перорал 1% раствор (1:100)	1 мл/ 1 кг тана вазни ёки 2 мл/1 л ичимлик суви	2-3 ҳафтада бир марта
	Даволаш			1-2 ҳафталик танаффус билан 2-3 марта
Ёш ва катта ёшли паррандалар	Профилактика	перорал	1 мл/ 1 кг тана вазни ёки 2 мл/1 л ичимлик суви	Ойда 1 марта
	Даволаш			1-2 ҳафталик танаффус билан 2-3 марта
ЙШХ МШХ	Профилактика	перорал	1 мл/50 кг тана вазни – катта ёшли хайвонлар. 0,5 мл/10 кг – ёш хайвонлар	2-3 ҳафтада бир марта
	Даволаш			7-10 кунлик танаффус билан 2-3 марта
Итлар, мушуклар, мўйнали хайвонлар	Профилактика	перорал	0,1 мл / 1 кг	2 ҳафтада 1 марта
	Даволаш			7-10 кунлик танаффус билан 3 марта



**Қўшимча вазн олишда ва ёш чорваларни
ривожланишида самарали восита !**


Е-селенит инъекция



Жониворлар организмида Е ва Селен моддаси миқдорини нормаллаштиришга қўмаклашувчи, даволаш ва профилактика учун мўлжалланган комплекс инъекция

- ▶ Яққол намоён бўладиган антиоксидант таъсирга эга
- ▶ Қўшимча вазн ва ёш чорваларни ривожланиб чиқишининг ошиши
- ▶ Иммунитетни рағбатлантирувчи, стрессга қарши ва антитоксик таъсирга эга
- ▶ Паст дозаларда юқори самарадорлик

ТАРКИБИ



— 0,5 мг селен (натрий селенити шаклида)
— 50 мг витамин Е



ЙШХ: 30 сутка
МШХ: 14 сутка

Ҳайвон тури	Қўлланадиган ҳолатлар	Қўллаш усули	Дозировкаси	Қўллашлар сони
ЙШХ МШХ	репродуктив функциянинг бузилишлари ҳомила ривожланишининг бузилишлари	м/и т/о	Катта ёшли ҳайвонларга: 1 мл/50 кг;	Профилактика мақсадида – 2-4 ойда бир марта;
Отлар	оқ мушак касаллиги, травматик миозит ва ардиопатия ўсишнинг ушланиши ва етарли бўлмаган вазн	м/и	ёш ҳайвонларга: 0,2 мл/10 кг	Даволаш мақсадида – 7-10 кунда бир марта 2-3 марта
Мушуклар Итлар Мўйнали ҳайвонлар	инфекцион ва инвазион касалликлар профилактик эмлашлар ва дегельминтизация нитритлар, оғир металллар ва микотоксинлар билан заҳарланиш стресслар ва стрессли вазиятлар	м/и т/о	0,04 мл/1 кг	

**Ёш чорваларни ривожланиб чиқиши
ва қўшимча вазн ошишини таъминлайди!**



Монта-3

А, Д3 ВА Е ВИТАМИНЛАРИ ФИЗИОЛОГИК АСОСЛАНГАН НИСБАТДА КЕЛТИРИЛГАН КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ПРЕПАРАТ



Монта-3 ҳайвонлар ва уй паррандалари организмга модда алмашинувини нормаллаштириш, инфекцион касалликларга қарши барқарорликни ошириш, ёш жониворларнинг ўсишини рағбатлантириш ва махсулдорлигини оширишда комплекс таъсир кўрсатади.

А, Д3 ва Е витаминлари етишмаслиги билан боғлиқ, гипо - ва авитаминозларнинг профилактикасида қўлланилади.

А, Д3 ва Е витаминлари етишмаслиги билан боғлиқ, гипо- ва авитаминозларнинг, шунингдек, ксерофталмия, рахит, остеомалация ва ҳайвонларнинг махсулдорлигининг функционал бузилишларини профилактикаси ва даволаниши учун қўлланилади.

Таркиби.

1 мл препарат таркибида 100 000 МЕ Витамин А (палмитат), 20 000 МЕ Витамин Д3 (холекалсиферол), Е (токоферол атсетат) 20,0 мг.

1 мл препарат таркибида	
Витамин А (палмитат)	100 000 МЕ
Витамин Д3(холекалсиферол)	20 000 МЕ
Витамин Е (токоферол атсетат)	20,0 мг

Махсус, такрорланмас таркибли асос!

Қўлланилиши:

Препарат ҳайвонларга ва уй паррандаларига бевосита оғиз орқали ёки озуқа ем ва сув билан аралаштирилган ҳолда қуйидаги меъёрларда берилади:

- ▶ уй паррандаларига - 3 литр ичимлик сувига 1 мл меъёрида 3 кун давомида;
- ▶ йирик шохли қорамоллар ва отларга – бир бош ҳайвонга 10 мл меъёрида 2-3 кун давомида ҳар куни;
- ▶ бузоқлар, қўйлар ва эчкиларга ҳар бир ҳайвонга 2 мл меъёрида, 2-3 кун давомида ҳар куни.

Препаратни ишлатишдан олдин флаконни яхшилаб чайқатинг. Таркибида препарат бўлган ичимлик суви ёки озуқа-ёмни 24 соат давомида қўлланилиши лозим.

Препарат қўлланилиши бўйича монелик мавжуд эмас.

Препарат қўлланилгандан кейин ҳайвонлар ва уй паррандаларини гўшт учун сўйишга, шунингдек чорвачилик ва паррандачилик махсулотларидан озиқ-овқат мақсадида фойдаланишга ҳеч қандай чекловларсиз рухсат этилади.

Модда алмашинувини яхшилашда ва инфекцион касалликларга қарши барқарорликни оширишда йиллар давомида синалган восита !



**Чорвачилик махсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ**



Монвит-Л СУЮҚ ВИТАМИНЛАР, МИНЕРАЛЛАР ВА АМИНОКИСЛОТАЛАР.



Хайвонлар ва уй паррандаларидаги витаминлар, минераллар ва аминокислоталар етишмовчилиги билан боғлиқ касалликларни даволаш ва профилактика қилиш, уларнинг ўсиш темпи, резистентлиги ва махсулдорлигини ошириш мақсадида қўлланилади.

Таркиби.

1 мл препарат таркибда қуйидаги витаминлар ва аминокислоталар мавжуд:

Витамин А (palmitat)	12 000 000 ME
Витамин Д3	3 200 000 ME
Витамин Э (atsetat)	3 200 мг
Витамин Б1	2 000 мг
Витамин Б6	1 200 мг
Кальций (pantotenat)	4 000 мг
Биотин	15 мг
Витамин С	4 000 мг
Витамин К3 (MSB)	800 мг
Аланин	3 800 мг
Аргинин HCl	1 800 мг
Глицин	2 200 мг
Глютамин кислота	3 800 мг
Лейтсин	1 200 мг
Лизин HCl	2 000 мг
Метионин	3 000 мг
Фенилаланин	900 мг
Тирозин	300 мг
Валин	800 мг

Монвит-Л - Жониворларни транспортда ташиш пайтидаги стрессларда, махсулдорликнинг пик пайтида, эмлашдан кейинги биринчи бир неча кун давомида ўсиш темпини яхшилаш учун ҳамда витамин ва аминокислоталар етишмаслиги билан боғлиқ бўлган касалликларни даволаш ва профилактика қилишда қўлланилади.

Препарат хайвонларга ва уй паррандаларига бевосита оғиз орқали ёки озуқа ем ва сув билан аралаштирилган ҳолда қуйидаги меъёрларда берилади:

- ▶ уй паррандалари ва қуёнларга 1 литр ичимлик сувида 0,5 – 1,0 мл меъёрида 3-5 кун давомида;
- ▶ қўзилар ва улоқларга ҳар бир хайвонга 1,5 мл меъёрида ҳар куни, 3-5 кун давомида;
- ▶ бузоқларга ҳар бир хайвонга 2,5 – 5 мл меъёрида ҳар куни, 3-5 кун давомида.

Препарат қўлланилиши бўйича монелик мавжуд эмас.

Препарат қўлланилгандан кейин хайвонлар ва уй паррандаларини гўшт учун сўйишга, шунингдек чорвачилик ва паррандачилик махсулотларидан озиқ-овқат мақсадида фойдаланишга ҳеч қандай чекловларсиз рухсат этилади.



Чорвачилик махсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ



МОНВИТ- Р^(W.S.P)

ВИТАМИНЛАР, МИНЕРАЛЛАР ВА
АМИНОКИСЛОТАЛАРНИ ТЎЛИҚ ТАЪМИНОТИ!



Хайвонлар ва уй паррандаларидаги витаминлар, минераллар ва аминокислоталар етишмовчилиги билан боғлиқ касалликларни даволаш ва профилактика қилиш, уларнинг ўсиш темпи, резистентлиги ва махсулдорлигини ошириш мақсадида қўлланилади.

Таркиби: 1 мг Монвит-П препарат таркибида қуйидаги витаминлар, минераллар ва аминокислоталар мавжуд:	
Витамин А	5 000 000 ME
Витамин D3	500 000 ME
Витамин Е	500 ME
Витамин B1	500 mg
Витамин B2	25 mg
Витамин B6	200 mg
Витамин B12	5 mg
Витамин PP (nikotinamid)	1 250 mg
Фолик кислотаси	100 mg
Кальций пантотенат	5 500 mg
Битартрат холин	1 000 mg
Метионин	1 000 mg
Лизин HCl	5 000 mg
Темир Сульфат	3 000 mg
Матрганес сульфат	3 500 mg
Рух сульфат	8 000 mg
Мис сульфат	350 mg
Натрий селенит	100 mg
Биотин	15 mg

Қўлланилиши:

Монвит-П - махсулдор хайвонлар ва паррандаларда витаминлар, минераллар ва аминокислоталар етишмаслиги билан боғлиқ ҳамда баланслашмаган озиқланиш оқибатида келиб чиққан касалликларни даволаш ва профилактика қилиш, ёш хайвонлардаги озиқланишнинг бузилиши оқибатидаги стресслар, эмлаш, дегелминтизация, транспортда ташиш, юқори хароратдан кейинги стрессларда, шунингдек, касалликларга резистентликни ошириш, озуқа хазм бўлишини яхшилаш учун, ҳамда отларнинг иш қобилиятини ошириш учун қўлланилади.

Препарат хайвонларга ва уй паррандаларига сув билан аралаштирилган ҳолда қуйидаги меъёрларда берилади:

- ▶ уй паррандалари жўжаларига 4 литр ичимлик сувига 1 гр меъёрида 5-7 кун давомида;
- ▶ янги туғилган уй хайвонлари: қўзилар ва улоқларга хар бир хайвонга кунига 1-2 гр меъёрида;
- ▶ бузоқлар ва тойчоқларга хар бир хайвонга кунига 3-5 гр меъёрида, 5-7 кун давомида.

Йирик хайвонларга:

- ▶ отларга - хар бир хайвонга кунига 50-75 гр меъёрида, 5-7 кун давомида;
- ▶ йирик шоҳли қорамоллар ва туяларга - хар бир хайвонга кунига 75 - 100 гр меъёрида, 5-7 кун давомида;

- ▶ қўйлар ва эчкиларга - хар бир хайвонга кунига 5-10 гр.

- ▶ Препарат тавсия этилган меъёрларда қўлланилганда хайвонлар ва қушлар организмга ҳеч қандай ножўя таъсир кўрсатмайди.

Препарат қўлланилиши бўйича ҳеч қандай монелик мавжуд эмас.

Препарат қўлланилгандан кейин хайвонлар ва уй паррандаларини гўшт учун сўйишга, шунингдек чорвачилик ва паррандачилик махсулотларидан озиқ-овқат мақсадида фойдаланишга ҳеч қандай чекловларсиз рухсат этилади.



Чорвачилик махсулотларига
ЧЕКЛОВЛРСИЗ



Виталин

Инъекциялар ва орал қўллаш учун эритма



1 мл препарат таркибида:

Витамин А	15000 МЕ
Витамин Д3	1000 МЕ
Витамин Е	20 мг
Витамин Б1	10 мг
Витамин Б2 Фосфат натрия	5 мг
Витамин Б6	3 мг
Никотинамид	35 мг
Пантотенол	25 мг
Витамин Б12	50 мкг

Биологик хусусиятлари

ВИТАЛИН ҳўжаликда витаминлар етишмаслигидан келиб чиқадиган касалликларни даволаш ва олдини олиш учун мўлжалланган, жумладан:

- бузилган ўсиш, янги туғилган ҳайвонларнинг заифлиги ва анемиясида, кўриш қобилияти пасайиш,
- ичак касалликлари, турли касалликлардан тузалишни тезлаштириш учун, анорексия (иштаха пастлиги), репродукциядаги юқумли касалликлар, рахит, мушакларни заиф ривожланиши, мушакларнинг титраши ва юрак етишмовчилиги, нафас олишда қийналиши ва паразитларга қарши даволанилаётганда ва профилактикасида(қўмакчи восита сифатида).

Қўллаш тартиби:	ВИТАЛИН - қорамол, от, қўй, ечки ва бошқа жониворларга ишлатилади. Препарат тери остига, мушак ичига ёки аста-секин вена ичига юборилади.
Отлар ва қорамоллар	20-30 мл
Бузоқлар, эчкилар, қўйлар	5-10 мл
Қўзилар 10 - 14 кун оралиғида такрорий қўллаш мумкин.	2-5 мл

Эҳтиёт чоралари.

Тавсия етилган дозаларда ножўя таъсирга олиб келмайди, .

Ҳайвонларни гўшт учун сўйиш ва ҳайвон маҳсулотларидан озиқ-овқат мақсадида фойдаланиш ВИТАЛИН препаратини қўллашда чекловларсиз рухсат етилган.



Чорвачилик маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ




ANALGIN 30%

ҲАЙВОНЛАР УЧУН ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ,
ОҒРИҚСИЗЛАНТИРУВЧИ ВА ИСИТМА
ТУШИРУВЧИ ДОРИ ВОСИТАСИНИ



ТАҚРИБИ



300 мг таъсир этувчи восита
анальгин ва ёрдамчи
воситалар мавжуд

Дори воситаси қалтирашга қарши сезиларли таъсирга эга (силлиқ мушак тонусларини камайтиради), ўрта даражада яллиғланишга қарши ва иситма туширувчи таъсирларга эга.

Ҳайвон организмида дори воситаси циклооксигеназаларни тормозланишига олиб келиши натижасида марказий ва периферик нерв тизимида таъсир қилади. Дори воситаси метеоризм, ошқозон атонияси, ичаклар спазмида организмга юборилганда ичакларнинг перистальтикасига таъсир кўрсатмасдан оғриқ кучини пасайтиради ва ҳайвонларни тинчлантиради, перистальтикани яхшилайти ҳамда газларни чиқиб кетишига ёрдам кўрсатади.

Организмга юборилганда оғриқсизлантирувчи таъсир кучи 1-2 соат давомида таъсир этади, вена қон томири орқали юборилганда юборилган вақтдан 10 минут ўтиб таъсир қила бошлайди ва 45—60 минут давом этади.

Қўллаш тартиби

Дори воситаси ҳайвонларга қон томирига (секинлик билан) ёки мушакка бир маротаба қуйидаги меъёларда юборилади (мл/бошга):

- ▶ **Отларга - 20-60,**
- ▶ **Қўй ва эчкиларга - 2-8,**
- ▶ **Иирик шохли ҳайвонларга - 20-50,**
- ▶ **Бузоқларга - 5-15,**
- ▶ **Итларга - 0,5-5.**

Қарши кўрсатмалар

Натрий метамизолга юқори таъсирчанлик.

Мушукларга; буйрак етишмовчилиги бўлган ҳайвонларга қўлланилмайди.

Отларнинг ошқозонининг ўткир кенгайишида юборилганда, отлар вақтинчалик тинчланади, бироқ касаллик ўтиб кетмайди. Шунинг учун бир вақтнинг ўзида анальгин 30% эритмаси билан бир вақтда ачитишга қарши воситалар қўлланилади. Тери остига юборилмайди.

Қўллаш учун алоҳида эҳтиёткорлик чоралари:

- ▶ Артерия ичига юборишга йўл қўйилмайди.
- ▶ Белгиланган доза ёки даволаш муддати оширилмайди.

Бўғозлик ва сут эмизиш даврида қўлланилиши:

Анальгин 30 ни бўғоз бияларга юбориш тақиқланади.

Анальгин 30 ни соғин ва бўғоз сигирларга қўлланилиши мумкин.

Ҳайвонларни дори воситаси билан сўнгги марта ишлов берилгандан сўнг қуйидаги муддатларда сўйилиши ва истеъмол қилиниши мумкин:

Отлар: 1 кун

Иирик шохли моллар: томир орасига юборилгандан сўнг: 1 кун,

мушак орасига юборилгандан сўнг: 4 кун

Ишлов берилган ҳайвонлар сутини истеъмол қилишга чекловлар мавжуд эмас.




Неоспрей (Окиспрей)

Маҳаллий қўллаш учун эритма



Neospray - Маҳаллий фойдаланиш
учун антисептик восита.

ТАРКИБИ



25 мг Oxytetracycline Hydrochloride
2 мг Gentian violet



8 кун

ДОЗАЛАШ ВА ФЙДАЛАНИШ УСУЛИ.

Ишлатишдан олдин идишни яхшилаб силкитинг ва 1-2 сония давомида пурканг. Шикастланган юзаларни, кирлардан тозалангандан кейин, 15-20 см масофа оралиғида пурканг.

Препаратни ортиқча оқишига йул қўйманг. 12-24 соатдан кейин муолажани такрорланг.

Кўзга тегишидан эҳтиёт бўлинг!

Препаратни қўллашда ҳеч қандай чекловлар йўқ.

Окситетрациклин - граммусбат ва грамманфий бактериялар, риккетциас, хламидия ва баъзи микоплазма турларининг оксил синтезига тўсқинлик қилувчи жуда барқарор кенг спектрли бактериостатик антибиотикдир.

Gentian violet - антисептик ва антифунгал бўёқ бўлиб, асосан грамманфий бактерияларга қарши таъсир етиб, микроорганизмларнинг ҳужайра деворига аралашиб кетади. Ушбу модда, шунингдек, даволаш майдонларини аниқлаш учун фойдалидир.

Неоспрейни қўллашдан олдин шикастланган сиртини тайёрлаб тозалаб олинг, ярани аэрозация қилинг, ўлик тўқималарнинг ва қон қуйқаларини тозалаб ташланг.

Препарат қуйидаги инфекцияланган микро организмларнинг турларига юқори самарали таъсир кўрсатади:

Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus и Streptococcus spp.

Профилактика мақсадида препаратни жарроҳлик аралашувлардан кейин, шу жумладан кастрациядан кейин, қулоқлар ва дум кесилганда, ва шунга ўхшаш амалиётларда қўллаш самарали.

Қорамолларда елин ва туёқларнинг травматик шикастланиши, туёқ чириши, некробактериоз, қирқилган яралар, куйиш, трофик яралар ва очиқ абсцесслар учун препаратни қўллаш тавсия етилади.

Қўй ва ечкиларда неоспрейни, жун олиш амалиётида терини кесилиб кетиши, туёқ чириши, некробактериоз, интердигитал дерматит, шунингдек, йирингли, яралар, очиқ абсцесслар, турли локализация вақтларида ишлатилади.



Йодижат (анти септо-спрей)


Ташқи томондан қўллаш учун эритма



Маҳаллий даволаш ва зарарсизлантириш учун
антисептик восита

- ▶ Пуркаганда ҳайвонларда стресс бўлмайди, чунки тери ва шиллиқ қаватларни ачиштирмайди
- ▶ Йодоповидон комплекси туфайли яққол ифодаланган микробларга қарши таъсир
- ▶ Жароҳатга зарарли микроорганизмлар тушишидан ҳимоя қилади
- ▶ Микроорганизмларнинг барча турлари (бактериялар, вируслар, замбуруғлар, бир ҳужайралилар)га нисбатан фаол
- ▶ Оғиз бўшлиғи ва бошқалардаги шиллиқ қаватларга пуркаш имконияти

СОСТАВ



30 мг повидон-йод



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВАРСИЗ

Қўлланадиган ҳолатлар	Дозировкаси ва қўллаш усули
Асептик ва инфекцияланган жароҳатлар, шиллиқ қаватларнинг яллиғланишлари, 1 ва 2 даражали куйишлар, экземалар ва дерматитларни маҳаллий даволаш ҳамда операцион ва инъекцион майдонга ишлов бериш учун	Ташқи томондан 10-20 см масофадан туриб юзадан визуал қопламагача пуркаш йўли билан қўлланади: Асептик ва инфекцияланган жароҳатларни, 1 ва 2 даражали куйишларни, экземалар ва дерматитларни даволашда 5-10 кун давомида суткасига 1-2 марта қўлланади. Оғиз ва ҳалқум бўшлиқларининг шиллиқ қаватларида 5-10 кун давомида суткасига 2-3 марта қўлланади. Операцион ва инъекцион майдонга ишлов бериш, ишлов берилган юза қуришини таъминлаган ҳолда, 2 марта амалга оширилади.



Комбат

ВЕТЕРИНАРИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯСИ УЧУН
(СУЮҚ КОНЦЕНТРАТ)



Таркибида 6,25% глутаралдегид, тўртламчи аммоний бирикмалари (дидетсил диметилхлорид аммоний, октил детсил диметилхлорид аммоний, диоктил диметилхлорид аммоний, н-алкидиметил бензил хлорид аммонийлар йиғиндиси) 12,50% каби таъсир этувчи субстанциялар мавжуд.

ЭДТК (этилендиаминтетрауксус кислотаси), игна баргилар мойи (скипидар), фосфор кислотаси, бриллиант кўки пигменти мавжуд.

Сақланиши:

Ишлаб чиқарувчи ўрамларида салқин, куруқ ва болалар қўли етмайдиган ҳамда куёш нуридан узоқроқ бўлган жойларда сақлансин.

Яроқлилик муддати:

Кўрсатилган сақлаш шароитларига амал қилинганда ишлаб чиқарилган кундан бошлаб - 3 йил.

Қўлланилиши:

Комбат препаратини:

- ▶ Барча турдаги товуқ фермаларида
- ▶ Сут фермалари
- ▶ Ветеринария клиникаларида
- ▶ Озиқ-овқат саноати объектларида
- ▶ Сўйиш корхоналарида
- ▶ Совутгичларда
- ▶ Донларни сақлаш иншоотларида
- ▶ Транспорт воситаларини
- ▶ Савдо шахобчалари ва ресторанлар
- ▶ Шунингдек тиббиёт марказларини дезинфекция қилиш учун тавсия этилади.

Комбат препарати пуркаш, эритмага ботириб олиш, аэрозол ва термофумигация йўли билан қўлланилади.

Пуркаш:

Оддий (регуляр) дезинфекция қилишда – 1:200 нисбатда (1 литр сувга 5 мл препарат) аралаштирилган холда.

Эпизоотияда - 1:50 нисбатда (1 литр сувга 20 мл препарат) аралаштирилган холда.

Ботириб олиш:

Оддий (регуляр) дезинфекция қилишда – 1:100 нисбатда (1 литр ванна сувига 10 мл препарат) аралаштирилган холда.

Эритма ҳафтасига икки марта алмаштирилади (ёки эритманинг ифлос бўлишига қараб).

Касаллик тарқалганда— 1:50 нисбатда (1 литр ванна сувига 20 мл препарат) аралаштирилган холда қўлланилади.

Эритмани ҳафтасига 3-4 марта алмаштирилади.



Аерозол:

Тахминан 100 куб метр хаво бўшлиғига 1:200 нисбатда тайёрланган (1 литр сувга 5 мл) 1 литр препарат эритмасини пуркаш тавсия этилади.

Термофумигация:

Препаратни 1:1 нисбатдаги меъёрда суюлтирилади ва тайёр бўлган эритмани (1 куб метр хажми фумигация қилиш учун 5 мл ҳисобида) термофумигаторга солинади.

- ▶ Ёқимли арча хиди
- ▶ Хашоратларга қарши воситалар билан бирга қўллаш имкони
- ▶ Узоқ давом этувчи таъсир
- ▶ Вируцидли, бактерицидли, ва фунгицидли таъсир
- ▶ Совуқ ва қаттиқ сувда ҳам самарали
- ▶ Металда чириш ҳосил қилмайди ва зҳарли таъсирга эга эмас

! Препарат кучли вируцид (ГП, ИББ, НБ, Яшур ва бошқалар.) га қарши

! Препарат кучли бактерицид (сальмонеллез, колибактериоз, клостридиум, споровыйларга ҳам) га қарши

! Препарат кучли фунгицид (Coccidia, Neospora sp., Cryptosporidium sp., Toxoplasma sp. и т.д.) га қарши

! Протозой {Coccidia, Neospora sp., Cryptosporidium sp., Toxoplasma sp.) га қарши

! Ва хашаротларни ҳайдовчи ҳам ҳисобланади

! Тез таъсир қилиш билан бирга, кисқа - 10 минут ичида фаоллашади ва 7 кунгача таъсир этади.

Янги авлод дезинфекция воситаси



**ЭНГ
ЯХШИ
ТАНЛОВ**



Цитринвет

ХАЙВОНЛАРДАГИ ЭКТОПАРАЗИТЛАРГА
ҚАРШИ ҚУРАШИШ УЧУН



Қўтир ва иксодли каналар, битлар, бургалар, пашшалар, чивинлар ва бошқа хашаротларнинг етилган турлари, личинкалари ва тухумларини йўқ қилиш учун хайвонлар ва молхоналарга ишлов бсришда қўлланилади.

Таркиби:

25% Циперметрин - концентрат эмулсияси

Йирик шохли қорамоллардаги иксодли каналарга қарши, 0.025% лик (таъсир этувчи моддасига кўра) - ишчи эритмаси ҳисобида:

- ▶ Ёш хайвонларга 1 бошга 1-1.5 литр ҳисобида
- ▶ Катта ёшдагиларига 2-3 литр ҳисобида 0.025% - ли ишчи эритмаси.
- ▶ Йирик шохли қорамоллардаги псороптозга қарши - 1 бошга 2-3 литр ҳисобида икки маротаба 8-10 кун оралиғи билан 0.05%-ли ишчи эритмаси.

Молхоналарни (хайвонлар йўқлигида) каналар ва бошқа хашаротларга қарши ишлов бсришда - 0.1% ли ишчи эритмасининг сарф меъёри 1 метр квадрат - ерга 200 мл.

Экспозиция 2.5-3 соат, шундан сонг охур ва идишларни кальцийланган соданинг 3% эритмаси билан дсзактивирланади.

Хайвонлар бехосдан препарат билан захарланган ҳолларда 100 кг вазнга 1 мл меъёрида 1% ли атропин эритмасини тери орқали юборилади.

Агар интоксикация ҳолати ўтиб кетмаса - атропинни ҳудди шу меъёрда такрор юборилади.

Шахсий профилактика чоралари

Препарат билан ишлаганда махсус кийимлар, резина қўлқоплар ва этиклардан фойдаланилади. Қури русуми "А" бўлган противогазлардан ёки Ф-62М, Астра-2, Лепесток-5, Лепесток-40, Лепесток-200 русумли респираторлардан лойдаларуш лозим.

Препарат кўзга тушганда сув билан ёки озиқ-овқат содасининг 2% ли эритмаси билан ювиш лозим.

Кўз шиллик қаватининг яллиғланислини кузатилса кўзга 30% ли албуцид, оғриқли бўлганда 2% ли новокаин томизилади.

Сақлаш шароитлари

Эхтиёткорлик билан (Б рўйхат), омборхона иншоотларида, ишлаб чиқарувчи ўрамларида озиқ-овқат маҳсулотларидан ва озуқа-емлардан алоҳида бўлган, очиқ олов манбаларидан ва иситиш ускуналаридан узоқроқ жойларда 0°C дан -р.30°C гача бўлган ҳароратда сақлаш лозим.



Цитрин 10%

10%-ЛИ КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛСИЯСИ



Хайвонлар ва қушлардаги эктопаразитларга қарши курашда қўлланилади.

Ситрин-10% (Cythrin-10%) - таркибида фаол моддаси полусинтетик пиретроид бўлган 10% (100 мг/мл) циперметрин мавжуд.

Сақланиши.

Препарат очилмаган идишларда 30° дан юқори бўлмаган ҳароратда курук, шамол айланадиган ва болалар қўли етмайдиган, шунингдек хайвонлардан узоқроқ жойда сақланади.

Юқорида кўрсатилган сақлаш шароитларига амал қилганда препаратнинг яроқлилик мuddати ишлаб чиқарилган санадан бошлаб 36 ой

Қўлланилиши.

Цитрин-10% - хайвон ва қушларни каналар, бургалар, битлар ва барча турдаги учувчи хашаротлар каби эктопаразитларга қарши ишлов бериш учун пуркаш ёки хайвонларни ваннада чўмилтириш йўли билан қуйидаги нисбатда суюлтирилган ҳолда қўлланилади:

Йирик шохли қорамол, отлар ва туялар - 1 литр сувга 1,5 мл

Қўй ва эчкиларга 1 литр сувга - 0,75 мл

Уй паррандаларига 1 литр сувга 5 мл

Итларга 1 литр сувга - 1 мл

Молхоналарга ишлов беришда препаратни 1 литр сувга 5 мл нисбатда суюлтирилган ҳолда қўлланилади.

Касалланган ва холсиз хайвонларга қўллаш тавсия этилмайди.

Кутиш даври

Хайвонлар ва қушларни гўшт учун сўйишга препарат билан ишлов берилганидан кейин 3 кундан сўнг рухсат этилади.

Препарат билан ишлов берилган хайвон ва қушлар сути ва тухумидан чекловларсиз фойдаланиш мумкин.

Эхтиёткорлик чоралари

Препарат билан ишлаганда шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиш лозим.

Пуркаш ишларини шамолга қарши олиб бориш мумкин эмас.

Препарат билан ишлаганда овқатланиш, ичимлик ичиш ва чекиш таъқиқланади.

Циперметринни паррандачиликда ҳам қўллаш имконияти!

Ҳавфсиз ва ишончли!



Диазин 600

(60% ЭМУЛСИЯ КОНЦЕНТРАТИ)
ХАЙВОНЛАРДАГИ ЭКТОПАРАЗИТЛАРГА
ҚАРШИ КУРАШИШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ.



Диазин 600 - таркибида 60% диазинон - 0,0-диетил-0-(2-изопропил- 4-метилпиримидил-6) тиофосфатнинг фосфорорганик бирикмалари ва ёрдамчи қўшимчалари бўлган препарат.

Дунёда ёғ асосли ягона диазинон!

Жониворлар учун хавфсиз!

Жониворнинг танасида қобиг ҳосил қилиб танага сўрилишини олдини олади!

Қўлланилиши.

Диазин 600 хайвонлар (йирик шохли қорамоллар, отлар, туялар, қўй, эчкилар ва итлар) га пуркаш ва сузиш ховузларида чўмилтириш йўли билан ишлов бериш, шунингдек молхоналарга ишлов бериш учун қўлланилади.

Препаратни сув билан қуйидаги нисбатда аралаштириб ишчи эмулсия тайёрланади:

Пуркаш учун:

Барча уй хайвонлари: 1:1000;

Ваннада чўмилтириш учун:

Қўйлар:

- ▶ бошланғич ванна: 1:2400;
- ▶ юқори концентратсияли ванна: 1:800.
- Йирик шохли қорамоллар:
- ▶ бошланғич ванна 1:1000;
- ▶ юқори концентратсияли ванна: 1:400.

Итларни 100 мл Диазин-600 препаратини 100 литр сувга қўшиб тайёрланган ишчи эмулсиясига солинган ҳолда ишлов берилади

Хайвонлар боқиладиган биноларни дори билан ишлов беришда пол ёки девор юзасининг 100 м² га ишлов бериш учун 5 литр ишчи суюқлигини тайёрлашда препарат сув билан 1:25 нисбатда (ишчи эмулсиядаги диазиноннинг улуши 2,4%) аралаштирилади.

Ишчи эмулсияни ветеринар врач ёки фелдшер бошчилигида ишлатишдан олдин шу куннинг ўзида тайёрлаб олинади.

Бутун танаси нам бўлган ҳолда чўмилтириш давомийлиги 30 сониядан кам бўмаслиги ва калласини икки марта ботириш лозим.

Хайвонларни чўмилтираётганда акарицидли суюқликнинг ҳарорати 15°С дан 25°С гача бўлиши, хаво ҳарорати эса 12°С паст бўлмаслиги лозим.

Йирик шохли қорамолларни даволаш мақсадида икки марта: қўтир каналарга қарши – 7-10 кун оралиғи билан, битларга қарши эса – 14 кун оралиғи билан, иксодли каналарга қарши паразитли хусусиятни намойиш этиш мавсумида кўрсатмага биноан лекин ишлов бериш оралиғи 10 кундан кам бўлмаслиги лозим.

Оммавий равишда ишлов беришдан олдин препаратнинг ҳар бир партиясини кичик бир гурӯҳдаги хайвонларда синаб кўрилади.

Агар хайвонларда чўмилтирилганидан кейин бир сутка давомида токсикоз белгилари кузатилмаса қолган хайвонларга ишлов беришга киришилади.

Соғин сиғирларга, касал, нимжон, озгин ва яхши озиқланмаган, шунингдек ёши 4 ҳафтагача бўлган қўй ва эчкиларга ишлов бериш мумкин эмас.

Кутиш даври

Хайвонларни гўшт учун сўйишга препарат билан охирги марта ишлов берилганидан кейин 20 кун ўтганидан сўнг рухсат этилади.

Молхоналарга ишлов бераётганда одамлар ва хайвонлар бўлмаслиги, шунингдек озуқа-ем қолдиқлари ва сувни йиғиштириб олинган бўлиши лозим.

Ишлов берилганидан кейин молхоналарни 30 дақиқа давомида шамоллатилади, охур ва сув идишлари ювилади.

Шундан сўнг хайвонларнинг киришига рухсат этилади.



ЯМ МАЗИ

Мазь Ям (Unguentum Yam)



Препарат ўзига хос ҳидга эга бўлган оч кулрангдан тўқ кулранг-жигар ранггача бўлган пастасимон консистенциянинг бир жинсли массасидан иборат.

Таркиби:

100 г препарат таркибида қуйидаги фаол моддалар мавжуд (г):

Қайин қатрони (Pix Liquida Betulae)	10
Қатронли скипидар (Oleum Terebithinae)	7
Олтингургурт (Sulfur)	10
Салицил кислотаси (Acidum salicylicum)	2
Рух оксиди (Zincy oxydum)	10
Лизол (Lysolum)	6

Ям мази трихофитии ва қўтир қўзғатувчиларига қарши фаол,

Экзема, дерматит ва бошқа тери касалликларида самарали.

Мазь таркибига кирадиган компонентлар акарицид ва фунгицид таъсирига эга.

Препарат иссиқ қонли ҳайвонлар учун кам заҳарли, таъсирлантирувчи ва сенсibiliзацияловчи таъсирга эга эмас.

Қўлланиладиган ҳолатлар

Экзема, трихофит дерматитлари ва бошқа тери касалликлари.

Мазь юпқа қатлам билан олдиндан пўстлар олиб ташланмасдан ва жунларни қирқмасдан терининг зарарланган жойига ва унинг атрофига 2-4 см атрофида суртилади; бунда у ишлов берилётган юзага енгилгина суртилади. Зарарланган жойларга кунига 1-2 марта пўсти ажралгунча ишлов берилади. Агар охириги 4-5 кун ичида ажралмаса, мазь билан ишқалаш давом эттирилади.

Одатда 7-10 кундан кейин зарарланган участкалар пўстлардан халос бўлади ва уларда тук ўсиши кузатилади. Даволашдан 10 кун ўтгач, зарарланган тери жойларидан қириб ташлашнинг микроскопик текширувлари ўтказилади. Агар қўзғатувчилар топилса, даволаниш такрорланади.






ИХТИОЛ МАЗИ (МАЗЬ ИХТИОЛОВАЯ)

ҲАЙВОНЛАРНИ ДАВОЛАШ УЧУН ИХТИОЛ МАЗИ 10%



Маҳаллий даволаш ва зарарсизлантириш учун
антисептик восита

ТАРКИБИ



10 г фармацевтика ихтиоли мавжуд

Ихтиол мази 10% антисептик ва яллиғланишга қарши таъсирга эга.

Яраларга қўлланганда у қон томирларини торайтиради, секреция ва экссудацияни камайтиради, шунингдек зарарланган тўқималарнинг тикланишини тезлаштиради.

Ихтиол мази 10% ҳайвонларда тери касалликлари (қуйиш, яралар, экзема, дерматит, фурункулóz, пёдерма), туёқ ва туёқ касалликлари, шунингдек артрит, тендинит, тендовагинит, бурсит, маститда ишлатилади.

Ихтиол мази 10% кунига 1-2 марта 5-10 кун давомида ташқи томондан қўлланилади, уни таъсирланган юзага ҳатто ингичка қатлам билан суртинг.

Ушбу қўлланма асосида ишлатилганда препарат ҳайвонларда ножўя таъсирларни ва асоратларни келтириб чиқармайди.

Препаратни қўллашга қарши кўрсатмалар аниқланмаган.

Ихтиол мазидан 10% фойдаланиш бошқа дори воситалардан фойдаланишни истисно қилмайди.

Ихтиол мойини ўз вақтида ва суртгандан кейин чорвачилик маҳсулотлари 10% чекловсиз ишлатилади.



Чорвачилик
маҳсулотларига
ЧЕКЛОВЛАРСИЗ



Ихтиол 99,8%



Таркиби. Ихтиол 99.8% (Ichthyolum 99.8%) - Ammonium sulfoichthyolicum ва 10.5% органик боғланган олтингугурт бор.

Фармакологик хусусиятлари

Ихтиол яллиғланишга қарши, маҳаллий аналгетик ва баъзи антисептик хусусиятларга эга.

Яраларга қўлланилганда қон томирларини торайтиради, секреция ва экссудацияни камайтиради ва шикастланган тўқиманинг регенерациясини тезлаштиради.

Қўллаш тартиби

Ихтиол препаратлари тери касалликлари яъни: куйиш, еритипелалар, экзема ва бошқалар учун ташқи тарафдан маҳаллий ишлатилади. Невралгия, артрит, тендинит, тендовагинит, бурсит ва бошқалар учун. малҳам ёки суяк яъни спирт билан бирга (10-30%) нистбатда суртилади; тоз касалликлари яъни метрит, параметрит, салпингит ва бошқаларда- ихтиолнинг 10% ли глицерин еритмаси билан свечи қуринишида ёки тампонлар қўринишида қўлланилади.

Ихтиолни қўллаш вақтида чорвачилик маҳсулотларига ҳеч қандай чекловларсиз ишлатилади.

Ихтиол 99,8% субстанция сифатида ветеринария препаратларини ишлаб чиқариш учун ҳам ишлатилади.

Сақлашниши

Болалар қўли етмайдиган, қуёш нурларидан ҳимояланган, 5°-20 °С гача бўлган жойларда, епиқ қадоқда сақланг.



Пропоксур

Паразитларга қарши восита



Парранда
қизил канаси



Бўғимоёқчилар
(Сўналар ва ҳашоратлар)

Пропоксур 20% (Propoxur20% EC) - Тизимли бўлмаган ошқозон ичак таъсирига эга инсектицидир.

Фаол модда (молекуляр формуласи $C_{11}H_{15}NO_3$) бўлган 20% (200 мг / л), пропоксурни ўз ичига олади.

Пропоксур пиретроидларга чидамли ҳашаротлар популяциялари учун жуда самарали.

Препаратнинг қолдиқ фаолияти 1-1.5 ойгача давом этади.

Препарат сув билан яхши аралашади.

Қўллангандан кейин юзаларга доғ қолдирмайди.

Атроф муҳитда егилмайди.

Ҳашаротларни ўзига жалб қилувчи ҳамда кучли таъсир билан йўқ қилувчи хусусиятга эга.

Пропоксур 20% ЕС жуда кўп турдаги зараркунандалар билан, жумладан учиб юрувчи ҳашаротлар кана,суварақ,бурга,чивин, пашша, ва ҳоказолар билан курашиш учун ишлатилади (эмульциянинг 0.5-1% сувли еритмаси кўринишида). Қўлланилиши: ҳашаротлар сони ва ишлов бериладиган юзалар турига қараб 1 м² га 50-100 мл ни ташкил этади.

Такрорий ишлов ҳашаротлар пайдо бўлганида амалга оширилади. 1 -1.5 ойда бир марттадан кўп қўллаш тавсия этилмайди.

Биноларни қайта ишлаш, ҳайвонлар ва қушлар йўқлигида амалга оширилади.

Кристалланишни олдини олиш учун препаратни ишчи еритма тайёрланган кунда ишлатилиши керак.

Фойдаланишдан олдин қўллаш учун кўрсатмани ўқинг!

Зараркунанда тури	Концентрацияси (%)		Препарат миқдори (мл) да		
	по ДВ	по препарату	1 л	10 л	100 л
Суварақлар	1	5	50	500	5 000
Каналар	1	5	50	500	5 000
Бургалар	0,5	2,5	25	250	2 500
Пашшалар	1	5	50	500	5 000
Товуқлардаги қизил кана	0,5	2,5	25	250	2 500
Чивинлар	0,5	2,5	25	250	2 500



АФЛАБОНД

ОШҚОЗОН КИСЛОТАСИНИ ОШИРУВЧИ
ВА МИКОТОКСИНЛАР АДДСОРБЕНТИ.



ТАРКИБИ: АФЛАБОНД ТАРКИБИДА АЛЮМОСИЛИКАТЛАРНИНГ СИНТЕТИК АРАЛАШМАСИ МАВЖУД: 1. Натрий силикати, 2. Кальций силикати.

ОРГАНИК ЗАМБУРУҒГА ҚАРШИ КИСЛОТАЛАР:

1. Пропион кислотаси.
2. Чумоли кислотаси.
3. Уксус кислотаси.
4. Бензой кислотаси.
5. Сорбин кислотаси, улар микотоксинларни селектив адсорбциялаш учун ишланган ва фаоллаштирилган.

АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

- ▶ Озуқалар сифатини яхшилаш
- ▶ Озуқалар бузилиши ёки зарарланиши хавфини камайтириш
- ▶ Озуқалар яроқлилиқ муддати ва сақланишини ошириш
- ▶ Ҳайвонлардаги бактериялар кўзгатган ичак фаолияти бузилишларини олдини олиш
- ▶ Ҳайвонлар ўсиши ва маҳсулдорлигини ошириш

Қишлоқ хўжалик паррандалари ва ҳайвонларининг озуқаларидаги микотоксинларни адсорбциялаш ва замбуруғлар ўсишини тўхтатиш учун биолог адсорбент. Препарат сараловчи, боғловчи таъсирга эга, витаминлар, минераллар ҳамда озуқа ва ингичка ичакдаги бошқа ингредиентларни фаоллаштиради, сақланаётган дон ва озуқалардаги намликни камайтириш ҳисобига могор кўпайишининг олдини олади. Препарат ошқозон кислотасини оширувчи восита, озуқа консерванти ва қумоқлар ҳосил бўлишига қаршилиқ қилувчи восита

ПАРРАНДАЛАР УЧУН КЎРСАТМАЛАР:

Жигарнинг микотоксинлар билан зарарланиши, шиллиқ қаватнинг сурункали касалликлари, тез-тез қайталанувчи ичак инфекциялари ва қон кетишлар, тухум маҳсулдорлигининг пасайиши, тухум пўстлогининг юқалиги, бройлерлар учун маҳсулот бирлигига озуқа сарфининг юқорилиги, иммунитет пастлиги, диарея, озуқа ҳазмининг ёмонлиги, сақланаётган озуқадаги замбуруғлар ўсиш тезлиги ҳамда озуқа грануласининг бир турда эмаслиги.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ҲАЙВОНЛАРИ УЧУН КЎРСАТМАЛАР:

Озуқа истеъмолининг пасайиши, сут маҳсулдорлигини камайтиши, сутдаги соматик ҳужайраларнинг юқори кўрсаткичи, микотоксинларнинг сутдаги йўл қўйилмайдиган даражаси, паст репродуктивлик функцияси, иммунитет пасайиши, жигар касалланиши, бузоқлар ўсишининг секинлашиши, емдан бош тортиш, маҳсулдорлик камайтиши, гастроэнтерит, ичакдаги қон кетишлар.

ПРЕПАРАТНИ НАМЛИК ДАРАЖАСИГА КЎРА ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ:

- ▶ Намлиги 12% дан паст - 500г дан 1 тонна озуқага.
- ▶ Намлиги 12% дан кўп - 1-2 кг дан 1 тонна озуқага.

МИКОТОКСИНЛАР ДАРАЖАСИГА КЎРА:

- 20 ppb дан кам - 500 г дан 1 тонна озуқага.
- 20-50 ppb - 1 кг дан 1 тонна озуқага.
- 50 ppb дан ортиқ - 2 кг ва ундан кўп 1 тонна озуқага, токсинлар даражасига мос равишда.

ШАХСИЙ ЭХТИЁТКОРЛИК ЧОРАЛАРИ:

Препарат таркибида эркин кислоталар мавжуд: восита билан иш вақтида қўлқоп ва ниқобларни тақиш лозим.

Болалар ва ҳайвонлар ололмайдиган жойда сақланади.

САҚЛАШ:


Салқин, қуруқ ва яхши шамоллатиладиган жойда сақланади.



ПУЛВИЗ АМПРОЛИУМ ПАРРАНДАЛАРДАГИ КОКЦИДИОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН 30% ЛИК АМПРОЛИУМ КУКУНИ.



СОСТАВ



300 мг ампролиум гидрохлорид

Ампролиум гидрохлорид, *Eimeria* spp., шу жумладан *Eimeria necatrix* ва *Eimeria tenella*, *E. acervulma*, *E. maxima*, *E. mivati* келтириб чиқарган парранда кокцидиозининг кўзгатувчиларига нисбатан кенг таъсир доирасига эга.

Ампролиум 30% кукун бройлер жўжаларида, ёш товуқларда ва насли паррандаларда кокцидиозларнинг олдини олиш ва даволаш учун ишлатилади.

Препарат куйдаги дозаларда озуқа ва ичимлик суви билан бирга оғиз орқали юборилади:

а) ичимлик суви билан аралаштирилиб:

► бройлер жўжаларига: профилактика мақсадида 3-5 кундан бошлаб ва ўсиш даврида, ҳар куни 500 литр ичимлик сувига 200 г препарат миқдорида, бу 1 литр сув учун 120 мг фаол моддага тўғри келади, сўйишдан 5 кун олдин препаратни бериш тўхтатилсин; даволаш мақсадида - 5-7 кун давомида ҳар куни 500 г ичимлик сувига 400 г препарат (1 литр сув учун 240 мг ДВ).

► тўлдириб туриладиган ёш товуқларга: профилактика учун 3-5 кунликдан 16 ҳафталикка қадар ҳар куни 500 литр ичимлик сувига 200 г препарат (1 литр сувга 120 мг ДВ); даволаш учун - 5-7 кун давомида ҳар куни 500 г ичимлик сувига 400 г препарат (1 литр сув учун 240 мг ДВ).

! **Изоҳ: Даволаш ва профилактика даврида препаратни ўз ичига олган сув қушлар учун ичимлик сувининг ягона манбаи бўлиши керак.**

б) озуқа билан аралаштирилиб:

► бройлер жўжаларига: 3-5 кундан бошлаб ва ўсиш даврида профилактика учун ҳар куни 1 тонна озуқага 400 г препарат миқдорида, бу 1 кг озуқа учун 120 мг фаол моддага тўғри келади, сўйишдан 5 кун олдин препаратни бериш тўхтатилсин; даволаш мақсадида - 5-7 кун давомида ҳар куни 1 тонна озуқага 800 г препарат (1 кг ем учун 240 мг ДВ).

► тўлдириб туриладиган ёш товуқлар: 3-5 кундан 16 ҳафтага қадар профилактика қилиш учун кунига 1 тонна озуқа учун 400 г препарат (1 кг ем учун 120 мг ДВ); даволаш учун - ҳар куни 5-7 кун давомида 1 тонна озуқага 800 г препарат (1 кг ем учун 240 мг ДВ).

Тухум қўядиган товуқларда препаратни қўллаш тақиқланади.

Паррандани гўшт учун сўйиш препаратни охириги марта ишлатганидан кейин 5 кун ўтгач рухсат этилади

! **Кокцидиозни даволашда ва олдини олишда ишончли восита!**




ТОЛТРАЗУРИЛ® OR

ХАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРДАГИ КОКСИДИОЗЛАРНИ
ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА
ҚИЛИШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ.



СОСТАВ



== 2.5% толтразурил

Қўлланилиши:

- ▶ Толтразурил® Орал эритма уй паррандалари, кабутарлар, бузоқлар, қўзилар, улоқлар ва қуёнлардаги кокцидиозларни даволаш ва профилактика қилиш учун қўлланилади.
- ▶ Толтразурил® Орал эритма ни уй паррандаларига ичимлик суви билан биргаликда кунига 1 кг қуш вазнига 7 мг толтразурил меъёрида, яъни 1 литр ичимлик сувига 1 мл препарат нисбатида аралаштирилган ҳолда 48 соат давомида узлуксиз бериб турилади ёки 1 литр ичимлик сувига 3 мл препарат ҳисобида аралаштирилган ҳолда 2 кун кетма кет 8 соат давомида узлуксиз бериб турилади.

Қўллаш давомийлиги:

- ▶ даволаш учун – битта даволаш (икки кун кетма-кет) 5 кундан сўнг такрорланади;
- ▶ профилактика қилиш учун (бройлерлар учун) – битта даволаш (икки кун кетма-кет) ҳаёти-нинг 9-10, 16-17 ва 23-24 кунларида.

Кабутарларга Толтразурил® Орал эритма ни ичимлик суви билан аралаштирилган ҳолда кунига 1 кг кабутар вазнига 20 мг толтразурил ҳисобида қўлланилади.

Қуёнларга профилактика мақсадида Толтразурил® Орал эритма ни ичимлик суви билан биргаликда кунлик меъёри 1 кг хайвон вазнига 25 мг толтразурил ҳисобида.

Қўзилар ва эчкиларга

Даволаш учун – оғиз орқали, кетма-кет икки кун давомида 5 кг хайвон вазнига 4 мл Толтразурил® Орал эритма препарати меъёрида;

Профилактика учун - оғиз орқали, бир марта, яъни яйловга чиқарилгандан кейин 7-кун 1 кг хайвон вазнига 2,5 мл Толтразурил® Орал эритма препарати меъёрида.

Бузоқларга:

Профилактика мақсадида оғиз орқали, 14-кунлик бўлгандан кейин кунига 1 кг хайвон вазнига 15 мг Толтразурил® Орал эритма ҳисобида (10 кг хайвон вазнига 6 мл Толтразурил® Орал эритма препарати) берилади.

Толтразурил® Орал эритма ни тухуми озик-овқат мақсадларида фойдаланиладиган товۇқларга бериш мумкин эмас.

Кутиш даври.

Уй паррандаларини препарат қўлланилгандан кейин 8 кун давомида, қўзилар, улоқлар, бузоқ ва қуёнларни эса 7 кун давомида гўшт учун сўйишга рухсат этилмайди.




КОКСУРИЛ

ХАЙВОНЛАР ВА ҚУШЛАРДАГИ
КОКСИДИОЗЛАРНИ ДАВОЛАШ
ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ
УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИ



ТАРКИБИ



25 мг фаол таъсир этувчи модда,
яъни толтразурил ва ёрдамчи
компонентлар (бензил спирти,
этанол амин, пропилен гликол, сув)



7 сутка

Қўлланилиши:

Коксурил уй паррандалари, кабутарлар, бузоқлар, қўзилар, улоқлар ва қуёнлардаги кокцидиозларни даволаш ва профилактика қилиш учун қўлланилади.

Коксурилни уй паррандаларига ичимлик суви билан биргаликда кунига 1 кг қуш вазнига 7 мг толтразурил меъёрида, яъни 1 литр ичимлик сувига 1 мл препарат нисбатида аралаштирилган ҳолда 48 соат давомида узлуксиз бериб турилади ёки 1 литр ичимлик сувига 3 мл препарат ҳисобида аралаштирилган ҳолда 2 кун кетма кет 8 соат давомида узлуксиз бериб турилади.

Қўллаш давомийлиги:

▶ даволаш учун – битта даволаш (икки кун кетма-кет) 5 кундан сўнг такрорланади;
▶ профилактика қилиш учун (бройлерлар учун) – битта даволаш (икки кун кетма-кет) ҳаётининг 9-10, 16-17 ва 23-24 кунларида.

Кабутарларга коксурилни ичимлик суви билан аралаштирилган ҳолда кунига 1 кг кабутар вазнига 20 мг толтразурил ҳисобида қўлланилади.

Қуёнларга профилактика мақсадида коксурилни ичимлик суви билан биргаликда кунлик меъёри 1 кг хайвон вазнига 25 мг толтразурил ҳисобида.

Қўзилар ва эчкиларга:

▶ даволаш учун – оғиз орқали, кетма-кет икки кун давомида 5 кг хайвон вазнига 4 мл коксурил препарати меъёрида;
▶ профилактика учун - оғиз орқали, бир марта, яъни яйловга чиқарилгандан кейин 7-кун 1 кг хайвон вазнига 2,5 мл коксурил препарати меъёрида.

Бузоқларга: профилактика мақсадида оғиз орқали, 14-кунлик бўлганидан кейин кунига 1 кг хайвон вазнига 15 мг толтразурил ҳисобида (10 кг хайвон вазнига 6 мл коксурил препарати) берилади.

Top Trade Plyus

компаниясининг махсулотларини
Ўзбекистон республикасидаги барча
ветеринария дорихоналаридан сўранг



Тошкент шаҳри, Сергели тумани
Қумариқ кўчаси 24а уй



toptradeplyus@mail.ru



shoikrom@inbox.ru



LOCATION

«Top Trade Plyus» LLC