



**TOP AGRO TRADE**



Ўзбекистон Республикаси,  
Тошкент шаҳар, Қумариқ кўчаси 24А уй



+998 (33) 704-80-00  
+998 (99) 761-80-00  
+998 (55) 502-80-00



[topagrotrade@mail.ru](mailto:topagrotrade@mail.ru)





TOP AGRO TRADE



**ЮҚОРИ СИФАТЛИ ПЕСТИЦИДЛАР**

# **КАТАЛОГИ**

Қишлоқ хўжалик экинларини касаллик, зараркунандалар ҳамда бегона ўтлардан ҳимоя қилиш ва улардан юқори ҳосил олишда қўлланилади.



 ИНСЕКТИЦИДЛАР

 АКАРАЦИДЛАР

 ФУНГИЦИДЛАР

 ГЕРБИЦИДЛАР

 МИНЕРАЛ ЎФИТЛАР

 ДЕФОЛЯНТЛАР

**“TOP AGRO TRADE” МЧЖ**

фирмаси дунёнинг йирик-  
**MONTAJAT VETERINARY  
PHARMACEUTICALS Co. Ltd.**

Саудия Арабистони Қироллиги ва  
**HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL  
CO. Ltd.**, ҳамда **AGRODAN**

**CHEMICALS CO.LTD** Хитой халқ  
республикасининг пестицид ишлаб  
чиқарувчи компанияларининг  
Марказий Осиёдаги  
дистрибьютори.

Шунингдек **“TOP AGRO TRADE”**  
компанияси ўсимликларни ҳимоя  
қилиш воситаларини етказиб бериш  
бозорида Республикада фахрли  
ўринларни эгаллаб, ўзининг  
кимёвий воситалар ҳилма ҳиллиги,  
юқори сифат, сарф-меъёрлари  
озлиги ҳамда препаратларнинг  
ҳамёнбоплиги билан ажралиб  
туради.

# МУНДАРИЖА

|                              |                                                         |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Абамек 1.8% э.к.             | Абамектин 18 г/л                                        | Инсектоакарацид |
| Делюкс Ультра 10% э.к.       | Дельтаметрин 100 г/л                                    | Инсектицид      |
| Супер Кар 10% э.к.           | Альфа - Циперметрин 100 г/л                             | Инсектицид      |
| Проплекс 16,9% эм.к.         | Тиаметоксам 139 г/л + абамектин 30г/л                   | Инсектоакарацид |
| Адвантэж 15% сус.к.          | Индоксакарб 150 г/л                                     | Инсектицид      |
| Паша 5% с.д.г.               | Эмаектин бензоат 50 г/кг                                | Инсектицид      |
| Мебраси 20% н.кук.           | Ацетамиприд 200 г/кг                                    | Инсектицид      |
| Агро Нурел 55% ем.к          | Циперметрин 50г/л + хлорпирифос 500 г/л                 | Инсектоакарацид |
| Агро Абамек 5% ем.к          | Abamectin 50 г/л                                        | Инсектоакарацид |
| Грант-ТЕ 5% эм.к.            | Ламбда-цигалотрин 50 г/л                                | Инсектицид      |
| Бетафос 20% эм.к.            | Хлорпирифос 180 г/л + Бета Циперметрин 20 г/л (200 г/л) | Инсектоакарацид |
| Агроплан Нео 20% с.э.к       | Ацетамиприд 200 г/л                                     | Инсектицид      |
| Эмаек 5,7% с.д.г.            | Эмаектин бензоат 57 г/кг                                | Инсектицид      |
| Тайфун Плюс 10% н.кук.       | Имидаклоприд 100 г/л                                    | Инсектицид      |
| Агроплан супер 5% н.кук.     | Ацетамиприд 30 г/кг+Бета-циперметрин 20 г/кг (50 г/кг)  | Инсектицид      |
| Агросиперфос 44% ем.к        | Сиперметрин 40 г/л + Профенофос 400 г/л                 | Инсектоакарацид |
| Summit 15% сус.к.            | Индоксакар 100 г/л + Эмоектин бензоат 50 г/л            | Инсектицид      |
| Стар Топ 32,5% сус.к         | Азоксистробин 200 г/л+дифенконазол 125 г/л              | Фунгицид        |
| Нуво 72.2% с.э.              | Пропамокарб ГХл 722 г/л                                 | Фунгицид        |
| Монтозол 10% Э.К.            | Пенконазол 100г/л                                       | Фунгицид        |
| Манкозеб Голд 72% нк         | Манкозеб 640 г/кг+Цимоксанил 80г/кг                     | Фунгицид        |
| Дуфарон 40% ем.к             | Пропиконазол 200 г/л + Тебуконазол 200 г/л              | Фунгицид        |
| Эвито Плюс 50% эм.к          | Пендименталин 500 г/л                                   | Гербицид        |
| Агро Номини 40% эм.к         | Биспирибак натрий 400 г/л                               | Гербицид        |
| Агрозеллек 10,4% э.м.к       | Галаксифол-R-метил 104 г/л                              | Гербицид        |
| Топ Обгурон Экстра 54% э.м.к | Tidiazuron 360 g/L + Diuron 180 g/L                     | Гербицид        |
| Грин Голд ( ўғит )           | 10 10 40+МЭ, 10 5 40+МЭ+MgO, 10 52 10+МЭ, 10 40 10+МЭ   | Микроэлемент    |
|                              | 15 30 15+МЭ, 18 18 18+МЭ, 20 20 20+МЭ                   | Микроэлемент    |



# Abamec

## 1.8%EC

*Каналарнинг барча турларига  
қарши юқори самарали,  
трансламинар таъсирга эга бўлган  
инсектоакарацид !*



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Абамектин 18 г/л     |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати |
| Кимёвий гуруҳ:         | Авермектин           |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф           |

Абамек 1.8% эм.к., контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали таъсир этувчи инсектоакарацид ҳисобланади. Барча қишлоқ хўжалик экинлари ва манзарали ўсимликларда қўлланилади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                                 | Зараркунанда тури                           | Сарф меъёри (л/га) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Помидор*                                  | Занг кана, помидор куяси                    | 0,3-0,35           |
| Ѓўза                                      | Ўргимчаккана, ғўза тунлами                  | 0,5                |
| Салат-латук, қалампир,<br>қовун, тарвуз   | Ширалар, каналар, қовун<br>пашшаси          | 0,4                |
| Бақлажон                                  | Ширалар, каналар, оққанот                   | 0,4                |
| Бодринг                                   | Каналар                                     | 0,25-0,4           |
| Олма, узум, нок, анор,<br>лимон, апельсин | Каналар, ширалар,<br>ғовакловчи куя         | 0,4                |
| Манзарали ўсимликлар                      | Ғовакловчи куя, унсимон<br>қўртлар, ширалар | 0,4                |

**Илова:\*** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Ўсимликларни кана, трипс ва ғовакловчи ҳашоратлардан ҳимоя қилишда юқори самарали инсектоакарацид;
- Каналарга, шу жумладан бошқа акарицидларга чидамли бўлган кана турларига қарши самарали, антирезистентлик; дастурларида ажойиб ҳамкор;
- Баргнинг устки ва пастки (трансламинар) томонидаги зараркунандаларидан ҳимоя қилувчи;
- Узок давом этувчи (3 ҳавтагача) ҳимоя таъсири ишлов беришлар сонини қисқартириш имконини беради;
- Сифатли ҳосил олишни таъминлайди
- Ишлов беришда 3-7 кундан сўнг ҳосилни йиғиш имконини беради;
- Ўсимликларда доғ қолдирмайди.

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia

# Delux Ultra

## 10% EC

*Фавкулот ҳолатларида кемирувчи  
ва сўрувчи зараркунандаларга  
тез ҳамда ишончли таъсир этувчи  
пиретроид!*



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Дельтаметрин 100 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати |
| Кимёвий гуруҳ:         | Синтетик пиретроид   |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф           |

Делюкс Ультра 10% эм.к., контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали таъсирга эга, тез таъсир қилувчи инсектицид ҳисобланади. Турли экинларда зараркунанда ҳашоратларнинг кўпгина турларига қарши қўлланади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                                                                | Зараркунанда тури                                                      | Сарф меъёри (л/га) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Помидор*                                                                 | Илдизқирқар (кемирувчи) тунлам, ғўза тунлами                           | 0,1                |
| Маккажўхори                                                              | Ғўза тунлами маккажўхори парвонаси                                     | 0,25               |
| Картошка                                                                 | Копорадо қўнғизи, картошка қуяси                                       | 0,035              |
| Бодринг, гармдори, бақлажон, карам, сабзи, пиёз, саримсоқ пиёз, гулкарам | Оққанотлар, ширалар, трипслар, ғовакловчи қуя, пиёз пашшаси, тунламлар | 0,1-0,15           |
| Уруғли ва данакли мевали дарахтлар                                       | Ширалар, қуялар, мевахўрлар, қалқондор, баргўрар қуртлар               | 0,1-0,15           |
| Бугдой ва арпа                                                           | Ширалар, трипслар, шилимшиқ қурт, хасва                                | 0,1-0,15           |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Кенг қамровга эга;
- Препарат ишчи эритмаси ўсимликлар баргининг юзасида ушлаб турувчи мойли плёнкани ҳосил қилади;
- Ёмғирда ювилиб кетишга чидамли;
- Лавлагини барча турларини сўрувчи зараркунандалардан узоқ вақт ҳимоя қилади;
- Помидордаги тунламларга қарши юқори самарали, ўсимликларда қолдиғи қолмайди;
- Препаратнинг узоқ вақт кўрсатадиган таъсир доирасида зараркунандаларга нисбатан иммун тизимини ҳосил бўлишини олдини олади;
- Экинларнинг ҳосилдорлигини оширади ва маҳсулот сифатини яхшилайди.

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia



# SuperCare

## 10% EC

Эмульсия концентрати контакт-  
овқат хазм қилиш органлари орқали  
таъсир этувчи пиретроид  
инсектицид!



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Альфа - Циперметрин 100 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати        |
| Кимёвий гуруҳ:         | Синтетик пиретроид          |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                  |

Супер Кар 10% эм.к., - жуда паст сарф меъёрларида марказий ва периферик асаб тизимига таъсир кўрсатади. Қўплаб экинларда кемирувчи сўрувчи ҳашоратларнинг кўп турларини назорат қилиш учун қўлланилади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                                            | Зараркунанда тури                                                                                          | Сарф меъёри (л/га) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ўза*                                                 | Қандалалар                                                                                                 | 0,3                |
| Полиз экинлари*                                      | Қовун пашшаси                                                                                              | 0,3-0,35           |
| Помидор, бодринг, гармдори, қарам, тарвуз, гулкарам  | Ширалар, оқанот, баргхўр қуртлар, илдиз кемирувчи тунлам, қарам қуяси, ғовақловчи қуя, трипслар, қўнғизлар | 0,15-0,25          |
| Қартошқа                                             | Қартошқа қуяси, ғовақловчи қуя, ширалар                                                                    | 0,2                |
| Бўғдой, арпа, маккажўхори, беда                      | Маккажўхори парвонаси, қўсак қурти, ширалар, илдиз кемирувчи тунлам                                        | 0,15-0,2           |
| Олма, шафтоли, ўрик, цитрус дарахтлари, узум, зайтун | Ширалар, унсимон қуртлар, қалқондорлар, кокцидлар, мевахўрлар, баргхўр қуртлар, қуялар                     | 0,15-0,30          |

Илова\*: Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Ривожланиш босқичларидан қатъи назар зараркунандаларга тез ва узоқ вақт таъсир кўрсатади;
- Ҳашоратлар ривожланишининг барча босқичларида самарали;
- Кам сарф-меъёрида қўлланилади, бу эҳтимолий салбий экологик самарани истисно этади;
- Формуляциянинг замонавий таркибий қисмлари препаратнинг фаол моддасини ўсимликлар юзасидан ишончли тарзда ушлаб туради ва ҳимоянинг узоқ даврини таъминлайди;
- Ҳосилнинг зарарли ҳашоратлар туфайли миқдор ва сифат йўқотишларидан узоқ сақлаш имконини беради;
- Бошқа пестицидлар билан биргаликда ишлатишда қулай.

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia

# PROPLEX 16.9% SUS.K

**Кемирувчи ва сўрувчи  
зараркунандаларга қарши янги  
авлод инсектоакарациди!**



|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Тиаметоксам 139 г/л +<br>абамектин 30г/л |
| Препарат шакли:        | Суспензия концентрати                    |
| Кимёвий гуруҳ:         | Неоникотиноид + авермектин               |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                               |

**Проплекс 16,9% сус.к.**, зараркунандаларга нафас йўллари, контакт, тизимли ва овқат хазм қилиш органлари орқали таъсир этиб нобуд қилади.

**Проплекс 16,9% сус.к.**, қишлоқ хўжалик экинларининг тунлам қуртлари, ширалар, трипслар, каналар ва ғовокловчи пашшаларга қарши юқори самарали.

### Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Зарарли организмлар       | Қўлланиш сарфи, л/га | Қўллаш муддатлари                   | Ҳосилни йиғишга неча кун қолганда ишлов якунланади |
|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Олма      | Олма мевахўри             | 0,2                  | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади | 30                                                 |
| Карам     | Оқ капалак, карам тунлами | 0,15                 |                                     | 30                                                 |
| Ўрик      | Ширалар                   | 0,15                 |                                     | 30                                                 |
| Дўза*     | Дўза тунлами              | 0,3                  |                                     | 30                                                 |
| Шафтоли   | Ширалар                   | 0,2                  |                                     | 30                                                 |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

### Афзалликлари:

- Тез ва узоқ таъсир этувчи препарат;
- Мукамал таркибли кенг қамровли препарат;
- Гормонал ва синтетик пиретроидга чидамли зараркунандаларга юқори самарали;
- Сўрувчи зараркунандаларга қарши юқори самарали;
- Мутахассис ва ишлаб чиқарувчи томонидан берилган қўрсатмаларга тўғри амал қилинса чидамлилик ҳосил бўлишини олди олинади;
- Атроф - муҳит учун ҳавфсиз.



# Advantage

## 15% SC

Ихтисослашган юқори  
самарали инсектицид!



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Индоксакарб 150 г/л   |
| Препарат шакли:        | Суспензия концентрати |
| Кимёвий гуруҳ:         | Оксадиазин            |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф            |

Адвантэж 15% сус.к., қўлланган майдонларда тунламларнинг барча турлари об-ҳавога боғлиқ равишда 48 соатда нобуд бўлади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури   | Зараркунанда тури                   | Сарф меъёри (л/га) | Қўллаш бўйича тавсиялар |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ёўза*       | Ёўза тунлами                        | 0,45               | Ўсув даврида пуркалади  |
| Маккажўхори | Маккажўхори парвонаси, ёўза тунлами | 0,35-0,4           | Ўсув даврида пуркалади  |
| Помидор     | Ёўза тунлами                        | 0,4                | Ўсув даврида пуркалади  |

Илова: \* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Энтомофагларга мутлоқо хавфсиз;
- Ҳаво хароратининг юқори ва паст бўлиши препарат самарадорлигига мутлақо таъсир этмайди;
- Препаратни қўллаш учун махсус вақт ва мослама талаб этилмайди.

# Pasha 5% SDG

Тунламларни барча турлари,  
помидор ва картошка куяларига  
қарши юқори самарали  
биологик инсектицид!



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Эмаектин бензоат 50 г/кг       |
| Препарат шакли:        | Сувда дисперсияланувчи гранула |
| Кимёвий гуруҳ:         | Авермектин                     |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                     |

Паша 5% с.д.г., Зараркунандаларнинг марказий нерв тизимини икки нуқтасига таъсир кўрсатади - биринчиси синапсда ресепторларни ГАМК боғлайди, иккинчиси Н-ресепторларни мускул хужайралари билан боғлайди. Бу ўз навбатида мускулларни бўшашига олиб келади, натижада мускуллар қисқармай зараркунандалар нобуд бўлади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури   | Зараркунанда тури                         | Сарф меъёри<br>(кг/га) | Қўллаш бўйича<br>тавсиялар |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Ѓўза*       | Ѓўза тунлами                              | 0,3-0,4                | Ўсув даврида<br>пуркалади  |
| Маккажўхори | Ѓўза тунлами,<br>маккажўхори<br>парвонаси | 0,3                    | Ўсув даврида<br>пуркалади  |
| Помидор     | Помидор ғовақловчи<br>куяси, ғўза тунлами | 0,3-0,4                | Ўсув даврида<br>пуркалади  |

Илова\*: Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Тунламларнинг барча ёшлари ва турларига юқори самарали препарат;
- Трансламинар хусусиятга эга бўлган препарат;
- Ҳаво хароратининг юқори ёки паст даражада бўлиши препарат самарадорлигига мутлақо таъсир этмайди;
- Атроф-мухит учун хавфсиз;
- Препаратни ишлатиш учун махсус вақт ва мослама талаб этилмайди.

Паша 5% с.д.ғ., препаратини биологик самарадорлиги ғўза тунламига қарши илмий асосда ишлатилишига боғлиқ.



# MEBRACY 20% SP

**Кучли тизимли таъсирга эга  
ҳамда ишончли ҳимоя  
инсектоакарициди!**



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Ацетамиприд 200 г/кг |
| Препарат шакли:        | Намланувчи кукун     |
| Кимёвий гуруҳ:         | Неоникотиноид        |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф           |

**Мебраси 20% н.кук., таъсир этиш механизими:** зараркундаларнинг асаб тизимига таъсир этиб зарарли хашоратларни нобуд этади.

**Мебраси 20% н.кук., зараркундаларга қарши тизимли, контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали таъсир этади.**

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури             | Зарарли организмлар               | Қўлланиш сарфи, кг/га | Қўллаш муддатлари ва чекловлари     | Ҳосилни йиғишга неча кун қолганда ишлов якунланади |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Бугдой*               | Ширалар, трипслар                 | 0,05-0,075            | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади | 30                                                 |
| Помидор* (Иссиқ хона) | Ғовақловчи куя, ширалар, оқ қанот | 0,3                   |                                     | 30                                                 |
| Олма                  | Ширалар                           | 0,3                   |                                     | 30                                                 |
| Вўза                  | Ширалар                           | 0,3                   |                                     | 30                                                 |
| Шафтоли               | Ширалар                           | 0,25                  |                                     | 30                                                 |
| Картошка              | Колорадо қўнғизи                  | 0,025                 |                                     | 30                                                 |
| Яйлов                 | Чигирткасимонлар                  | 0,04-0,045            |                                     | -                                                  |
| Бодринг (Иссиқ хона)  | Оқ қанот, ширалар                 | 0,025-0,3             |                                     | 30                                                 |

**Илова:\*** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Ушбу препаратни бошқа препаратлар билан қўлласа ҳам бўлади;
- Ўсимликларга тез сингувчи;
- Препарат +20 - +25 градус хароратда қўлланилса юқори самара беради;
- Кенг қамровли таъсирга эга;
- Тез таъсир этувчи восита;
- Зарарли ҳашоратларнинг барча (тухуми ва личинкаси) шаклларига юқори самарали.

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia

# AGRO NURELL 55% em.k.

*Сўрувчи ва кемирувчи  
зараркунандаларга қарши  
юқори самарали инсектицид!*



|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Циперметрин 50г/л +<br>хлорпирифос 500 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати                       |
| Кимёвий гуруҳ:         | Фосфорорганик бирикма +<br>пиретроид       |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                 |

**Таъсир этиш механизми:** Агро Нурелл 55% эм.к., зараркунандаларга қарши, контакт, овқат ҳазм қилиш йўли билан, фумигант, айрим жойларга тизимли ва хуркутувчи таъсирлар кўрсатади. Сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларнинг барча ёшига юқори самарали.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Зараркунанда тури                  | Сарф-меъёрлари л/га | Қд* | Нм** |
|-----------|------------------------------------|---------------------|-----|------|
| Ўза*      | Қандалалар, тунламлар              | 1,0 - 1,5           | 40  | 2    |
| Олма      | Олма мевахўри                      | 1,0 - 1,5           | 30  | 2    |
| Бугдой    | Хасва, шиллик қурт                 | 0,5                 | 30  | 2    |
| Ток       | Шингил барг ўрари, унсимон қуртлар | 1,0 - 1,5           | -   | -    |

**Илова:\*** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган

\*Қд (кутиш даври): ҳосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, кун.

\*\*Нм (неча марта): бир мавсумда қўпи билан неча марта ишлатилади.

## Афзалликлари:

- Тез ва узоқ таъсир этувчи препарат;
- Мукамал таркибли кенг қамровли препарат;
- Ҳаво ҳарорати + 20° С қўтарилганда зарарли организмларга фумигант таъсир кўрсата бошлайди;
- Сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга қарши юқори самарали;
- 2 соатдан кейин ёмғир ёғиши самарадорликка мутлақо ҳавфсиз;
- Атроф - муҳит учун ҳавсиз.





# AGRO ABAMEK 5% em.k.

*Каналарнинг барча турларига  
қарши юқори самарали  
инсектицид!*



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Abamectin 50 г/л     |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати |
| Кимёвий гуруҳ:         | Перитроид            |
| Захарлилик даражаси:   | IV - синф            |

**Агроабамек 5% эм.к.,** - Бу келиб чиқиши биологик бўлган, авемектинлар гуруҳига кирувчи ихтисослашган акарацид хисобланади. Abamectin – Тупроқ микроорганизми- *Streptomyces avermititis* махсулидан олинган бўлиб таркиби бўйича ҳеч бир мавжуд кимёвий бирикмаларга ўхшамайди. Препарат контактли ва ошқозон-ичак орқали таъсир қилиш хусусиятига эга. Абамектин захарлилиги бўйича IV-синфга киради.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури         | Зараркунанда тури                              | Сарф-меъёрлари л/га | Қд* | Нм** |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----|------|
| Ўза*              | Ўримчаккана*, ўза тунлами, ширалар, қандалар   | 0,15                | 30  | 2    |
| Помидор           | Занг канаси, помидор ғовакловчи куя, каналар   | 0,08                | 30  | 2    |
| Иссиқхона помидор | Ғовакловчи пашшалар, каналар, оққанот, ширалар | 0,075               | 30  | 2    |
| Олма              | Ўримчаккана                                    | 0,2                 | 30  | 2    |

**Илова:\*** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган

\*Қд (кутиш даври): ҳосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, кун.

\*\*Нм (неча марта): бир мавсумда қўли билан неча марта ишлатилади.

## Афзалликлари:

- Препарат каналарни самарали равишда нобуд қилади.
- Фойдали энтомофаунага минимал даражада таъсир кўрсатади.
- Препаратнинг дастлабки белгилари илк кундаёқ намоён бўлади.
- Зараркунанда чала фалаж ҳолатига келади.
- 2-3 кундан сўнг зараркунанданинг асаб тизими буткул ишдан чиқиб тўлиқ фалажга ва зараркунанданинг нобуд бўлишига олиб келади.
- Хаво ҳароратининг 20С-25С даражадан кутарилмаган ҳолда 10 кундан сўнг такрорий ишловни амалга ошириш мумкин.
- Ўсимликларда доғ қолдирмайди.



# Grand-TE 5% EK

*Қишлоқ хўжалик экинларида  
зараркунандаларга қарши кенг  
спектрда қўлланувчи юқори самарали  
инсектоакарицид!*



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Ламбда-цигалотрин 50 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати     |
| Кимёвий гуруҳ:         | Синтетик пиретроид       |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф               |

**Таъсир этиш механизми:** Грант-ТЕ 5% эм.к., контакт ва ичдан таъсир этиб, хуркитувчи (репеллент), фалаж қилувчи, озикланишдан қолдирувчи (антифидинг) ва “ноқдаун” ҳолатига олиб келувчи инсектоакарицид.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури   | Зараркунанда тури                          | Сарф меъёри (л/га) | Қўллаш бўйича тавсиялар             |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Бугдой*     | Ширалар, трипслар, шилимшиқ куртлар, хасва | 0,2-0,25           | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади |
| Беда*       | Узунбурун қўнғизлар                        | 0,25-0,3           |                                     |
| Яйлов*      | Чигирткасимонлар                           | 0,15-0,25          |                                     |
| Маккажўхори | Ўза тунлами, маккажўхори парвонаси         | 0,45               |                                     |
| Ўза         | Қандалалар                                 | 0,6-0,8            |                                     |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Препаратнинг кучли инсектицидлик хусусияти бевосита текканда ва озуқа орқали ютилганда ёрқин намоён бўлади;
- Фосфорорганик ва хлороорганик препаратларга чидамли хашоратларга юқори самарали;
- Дунёда, турли экинларда, кенг спектрда, энг кенг миқёсида ишлатилувчи препарат;
- Бир вақтда ҳам келтирувчи ва сўрувчи зараркунандаларга қарши юқори самарали восита;
- Атроф-муҳит учун хавфсиз.



# BETAFOS

## 20% ЕК

*Кемирувчи ва сўрувчи  
(ТРИПС) зараркундаларга  
қарши юқори самарали  
инсектоакарацид препарати!*



|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Хлорпирифос 180 г/л + Бета Циперметрин 20 г/л (200 г/л) |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати                                    |
| Кимёвий гуруҳ:         | Фосфорорганик бирикмалар + синтетик пиретроид           |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                              |

**Бетафос 20% эм.к.**, зараркундаларга нафас йўли орқали таъсир этиб ва нобуд қилади.

**Бетафос 20% эм.к.**, кишлоқ хўжалик зараркундаларига қарши контакт ва овқат хазм қилиш тизими орқали ҳамда тизимли ва фумигант таъсир этади. Бу эса ўз навбатида препаратнинг мукамаллигини таъминлайди.



| Экин тури               | Зараркунанда тури           | Сарф меъёри (л/га) | Қўллаш бўйича тавсиялар             |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Олма*                   | Олма мевахўри               | 2,5-3,0            | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади |
| Карам*                  | Оқ капалак, карам тунлами   | 1,5-2,0            |                                     |
| Ўрик*                   | Ширалар                     | 1,5                |                                     |
| Ўза                     | Ширалар, трипслар           | 1,5                |                                     |
| Шафтоли                 | Ширалар                     | 1,5                |                                     |
| Картошка                | Коларадо қўнғизи            | 1,3                |                                     |
| Бодринг<br>(Иссиқ хона) | Оқ қанот, ширалар, трипслар | 1,5-2,0            |                                     |
| Маккажўхори             | Ўза тунлами                 | 1,3                |                                     |

**Илова:\*** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

#### Афзалликлари:

- Мукамал таркибли, кенг қамровли препарат;
- Ёз ойларида ҳаво хароратининг юқори даражада бўлиши, препаратни зараркунандаларга таъсирини фумигантлик хусусиятини кучайтиради;
- Ҳавонинг салқин вақтлари (эрта баҳор ва кеч куз ойлари)да зараркунандаларга қарши ишлатиш, препаратнинг самарадорлигига салбий таъсир этмайди;
- Атроф-муҳит учун хавфсиз;
- Гормонал ва синтетик пиретроидга чидамли зараркунандаларга юқори самарали;
- Сўрувчи зараркунандаларга қарши юқори самарали.



# AGROPLAN NEO

## 20% sek

Зараркунандаларга қарши  
янгича ва юқори самарали  
ечим!



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Ацетамиприд 200 г/л     |
| Препарат шакли:        | Сувда эрувчи концентрат |
| Кимёвий гуруҳ:         | Неоникотиноид           |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф              |

Агроплан Нео 20% с.э.к., кимёвий воситаси зараркунандаларга қарши контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали ҳамда тизимли таъсир этувчи ишончли восита.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Зараркунанда тури                 | Сарф меъёри (л/га) | Қўллаш бўйича тавсиялар             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ўза                      | Ширалар, трипслар, оқ қанот       | 0,2                | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади |
| Помидор*<br>(Иссиқ хона) | Говакловчи куя, ширалар, оқ қанот | 0,3                |                                     |
| Олма*, Ўрик*             | Ширалар                           | 0,3                |                                     |
| Ўза,<br>Маккажухори      | Ўза тунлами                       | 0,3                |                                     |
| Шафтоли                  | Ширалар                           | 0,25               |                                     |
| Картошка                 | Коларадо қўнғизи                  | 0,2-0,25           |                                     |
| Яйлов                    | Чигирткасимонлар                  | 0,04-0,045         |                                     |
| Бодринг<br>(Иссиқ хона)  | Оқ қанот, ширалар                 | 0,25-0,3           |                                     |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Зараркунандаларга қарши, кенг қамровли таъсир этувчи восита;
- Тез самарали таъсир этувчи восита;
- Препарат самарадорлиги ҳаво ҳароратига чидамли;
- Ўсимлик тўқималарига тез сингувчи ва тўқималарда осон ҳаракатланиш хусусиятига эга;
- Талаб этилган меъёрларда ишлатиш ўсимликларга салбий таъсир этмайди;
- Зараркунандаларнинг тухум ва личинкасини ривожланишига тўсқинлик қилади;
- Сўрувчи зараркунандалардан ишончли ҳимоя.

Ишлаб чиқарувчи:  
Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,LTD



# EMAMEK

5,7% s.d.g

**Кемирувчи (тунлам) куртларига қарши, биологик ва иқтисодий самарадорлиги юқори, трансламинар хусусиятга эга препарат!**



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Эмамектин бензоат 57 г/кг      |
| Препарат шакли:        | Сувда дисперсияланувчи гранула |
| Кимёвий гуруҳ:         | Авермектин                     |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                     |

**Эмамек 5,7% с.д.г.**, ўсимликларга трансламинар тарзда, зараркунандаларга - контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали таъсир этади.

Зараркунандаларнинг марказий нерв тизимини икки нуқтасига таъсир кўрсатади - биринчиси синапсда ресепторларни ГАМК боғлайди, иккинчиси Н - репесепторларни мускул хужайралари билан боғлайди. Бу ўз навбатида мускулларни бўшашишига олиб келади, натижада мускуллар қисқармай зараркунандалар 48 соатда nobуд бўлади.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури   | Зараркунанда тури                        | Сарф меъёри<br>(кг/га) | Қўллаш бўйича<br>тавсиялар             |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Ўза*        | Ўза тунлами                              | 0,3-0,4                | Ўсимликларни ўсув<br>даврида пуркалади |
| Помидор*    | Помидор ғовакловчи<br>куяси, ўза тунлами | 0,3-0,4                |                                        |
| Маккажўхори | Ўза тунлами,<br>маккажўхори<br>парвонаси | 0,3                    |                                        |
| Шафтоли     | Шафтоли мевахўри                         | 0,3                    |                                        |
| Картошка    | Картошка куяси                           | 0,4                    |                                        |

Илова\*: Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Тунламларнинг барча ёшлари ва турларига юқори самарали препарат;
- Тансламинар хусусиятга эга бўлган препарат;
- Ҳаво хароратининг юқори ёки паст даражада бўлиши препарат самарадорлигига мутлақо таъсир этмайди;
- Атроф-муҳит учун хавфсиз;
- Препаратни ишлатиш учун махсус вақт ва мослама талаб этилмайди.





# TAYFUN

## 10% WP PLUS

*Заракунандаларга нисбатан  
юқори таъсир хусусиятига эга!*



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Имидаклоприд 100 г/л |
| Препарат шакли:        | Намланувчи кукун     |
| Кимёвий гуруҳ:         | Неоникотиноид        |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф           |

Тайфун Плюс 10% н.кук., сўрувчи ва айрим кемирувчи зараркунандаларга қарши тизимли, сиртдан ва ичдан таъсир этади.

| Экин тури                          | Зараркунанда тури                                         | Сарф меъёри<br>(кг/га) | Қўллаш бўйича<br>тавсиялар             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Тамаки*                            | Ширалар, трипслар                                         | 0,2-0,4                | Ўсимликларни ўсув<br>даврида пуркалади |
| Манзарали ва ўрмон<br>ўсимликлари* | Ширалар,<br>баргхўрлар,<br>баргўрар ва унсимон<br>қуртлар | 0,5-0,6                |                                        |
| Олма*                              | Қон бити,<br>қалқондорлар                                 | 0,4-0,5                |                                        |
| Ўрик                               | Ширалар                                                   | 0,5                    |                                        |
| Ўза                                | Қандалалар                                                | 0,6                    |                                        |
| Шафтоли                            | Ширалар                                                   | 0,4                    |                                        |
| Картошка                           | Колорадо қўнғизи                                          | 0,4-0,45               |                                        |
| Яйлов                              | Чигирткасимонлар                                          | 0,1-0,2                |                                        |
| Бодринг<br>(Иссиқ хона)            | Оқ қанот, ширалар                                         | 0,1-0,2                |                                        |
| Маккажўхори                        | Ўза тунлами                                               | 0,8                    |                                        |

Илова: \* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

#### Афзалликлари:

- Сарф-меъёри ўта кам миқдорда ишлатилади;
- Ўсимлик тўқималарига тез сингувчи ва тўқималарда осон ҳаракатланувчи препарат;
- Сўрувчи зараркунандаларга қарши юқори самарали;
- Кенг қамровли таъсирга эга;
- Препарат қўлланган майдонларда биологик самарадорлиги узок вақт сақланиб қолади;
- Ишлов берилган майдонларда зарарли ҳашоратларни қўпайишини олдини олади ва тўлиқ назорат қилади.



# AGROPLAN SUPER 5% NK

*Зараркунандаларга қарши  
замонавий, мукаммал  
ишончли восита!*



|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Ацетамиприд 30 г/кг+Бета-циперметрин 20 г/кг (50 г/кг) |
| Препарат шакли:        | Намланувчи кукун                                       |
| Кимёвий гуруҳ:         | Неоникотиноидлар+синтетик пиретроид                    |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                             |

**Агроплан супер 5% н.кук., таъсир механизими:** зараркунандаларнинг нерв тизимига таъсир этади, нерв толаларининг синапсларида импульсларининг узатилишини бузади, натижада кучли нерв толаларидаги, кўзғалиш туфайли зараркунандалар нобуд бўлади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Зараркунанда тури                    | Сарф меъёри<br>(кг/га) | Қўллаш бўйича<br>тавсиялар             |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Бугдой*                  | Ширалар, трипслар,<br>оқ қанот       | 0,2                    | Ўсимликларни ўсув<br>даврида пуркалади |
| Помидор*<br>(Иссиқ хона) | Говакловчи куя,<br>ширалар, оқ қанот | 0,3                    |                                        |
| Олма*, Ўрик*             | Ширалар                              | 0,3                    |                                        |
| Ўза,<br>Маккажухори      | Ўза тунлами                          | 0,3                    |                                        |
| Шафтоли                  | Ширалар                              | 0,25                   |                                        |
| Картошка                 | Коларадо қўнғизи                     | 0,2-0,25               |                                        |
| Яйлов                    | Чигирткасимонлар                     | 0,04-0,045             |                                        |
| Бодринг<br>(Иссиқ хона)  | Оқ қанот, ширалар                    | 0,25-0,3               |                                        |

**Илова:** \* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Кучли тизимли таъсир ва кенг қамровли восита;
- Зараркунандалардан узоқ муддатли ҳимоя;
- Тез таъсир этувчи восита;
- Зараркунанданинг турига боғлиқ ҳолда тухуми, личинкаси ва етук шакллариغا таъсир этади;
- Сўрувчи зараркунандаларда ишончли ва узоқ муддатли ҳимоя.

Ишлаб чиқарувчи:  
Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,LTD



# AGROCYPERFOS

44% em.k

*Зараркунандаларга  
қарши мукаммал  
ишончли восита!*



|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Сиперметрин 40 г/л +<br>Профенофос 400 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати                       |
| Кимёвий гуруҳ:         | Фосфорорганик бирикма +<br>пиретроид       |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                 |

**Агросиперфос 44% ем.к**, Инсектицид зараркунандаларнинг контакт ва овқат хазм қилиш органлари орқали асаб тизимига таъсир қилади, бу еса барча ўсимлик зараркунандаларининг тез фалажланишига олиб келади. Кимёвий таркиби жиҳатидан фарқ қилувчи препаратнинг иккала компоненти, айниқса, лепидоптера зараркунандаларининг личинкаларига ва бошқа ҳашаротларга қарши самарали таъсир этади. Шира, ўргимчаккана, оққанотлар, трипс ва бошқа сўрувчи ҳашаротлар билан яхши курашади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Зараркунанда тури         | Сарф-меъёри,<br>л/га | Қд* | Нм** |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----|------|
| Ўза*      | Ўргимчаккана, шира, трипс | 0,1                  | 30  | 2    |
| Пиёз      | Трипс, пиёз пашшаси       | 0,5-1,0              | 30  | 2    |

**Илова:**\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган

\*Қд (кутиш даври): ҳосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, кун.

\*\*Нм (неча марта): бир мавсумда қўли билан неча марта ишлатилади.

## Афзалликлари:

- Препарат фосфорорганик бирикма бўлиб зараркунандаларнинг асаб тизимига узоқ таъсир қилади
- Таъсир натижасида баргларнинг тўқималарига осонгина кириб боради.
- Зараркунандаларни нокдаун ҳолатига олиб келади
- Асаларилар учун мутлоқ зарарсиз хусусиятига эга.
- Сўрувчи зараркунандаларда ишончли ва узоқ муддатли ҳимоя.



# SUMMIT

## 15% SUS.K

*Кемирувчи (тунлам) қуртларига қарши, биологик ва иқтисодий самарадорлиги юқори, трансламинар хусусиятга эга препарат!*



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Эмаектин бензоат 50 г/л + Индоксакарб 100 г/л |
| Препарат шакли:        | суспензия концентрати                         |
| Кимёвий гуруҳ:         | Авермектин + оксидиязин                       |
| Заҳарлилик даражаси:   | II - синф                                     |

**Summit 15% эм.к.,** - Контакт ва овқат ҳазм қилиш органлари орқали таъсир этувчи пестицид тунламларнинг нерв тизимларининг натрий каналлари ўтказувчанлигини ишғол этади. Оқибатда, захарланган ҳашорат озиқланишдан тўхтайди ва 1-2 кунда нобуд бўлади.

### Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури   | Зараркунанда тури                        | Сарф меъёри<br>(кг/га) | Қўллаш бўйича<br>тавсиялар             |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Ўза*        | Ўза тунлами                              | 0,3-0,4                | Ўсимликларни ўсув<br>даврида пуркалади |
| Помидор*    | Помидор ғовакловчи<br>куяси, ўза тунлами | 0,3-0,4                |                                        |
| Маккажўхори | Ўза тунлами,<br>маккажўхори<br>парвонаси | 0,3                    |                                        |
| Тут         | Тут парвонаси                            | 0,3                    |                                        |
| Картошка    | Картошка куяси                           | 0,4                    |                                        |

### Афзалликлари:

- Тунламларнинг барча ёшлари ва турларига юқори самарали препарат;
- Танслайналар хусусиятга эга бўлган препарат;
- Ҳаво хароратининг юқори ёки паст даражада бўлиши препарат самарадорлигига мутлақо таъсир этмайди;
- Атроф-муҳит учун хавфсиз;
- Препаратни ишлатиш учун махсус вақт ва мослама талаб этилмайди.

# STARTOP

32.5% sus.k

Мукаммал фунгицид!



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Азоксистробин 200<br>г/л+дифенконазол 125 г/л |
| Препарат шакли:        | Суспензия концентрат                          |
| Кимёвий гуруҳ:         | Стробилуринлар ва Триазол                     |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                    |

Азоксистробин замбуруғларига қарши контакт ва тизимли таъсир этиб, замбуруғ касалликларидан ҳимояловчи хусусиятга эга;  
Дифенконазол моддаси контакт ҳамда тизимли таъсир қилиш хусусиятига эга бўлиб, касалликларни даволовчи ва ҳимояловчи таъсирга эга.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Касалликлар тури                  | Қўллаш сарфи л/га | Ишлатиш мuddатлари                    | Хосилни йиғишга неча кун қолганда ишлов якунланади |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ток*      | Милдью, оидиум                    | 0,5               | Ўсимликларнинг усув даврида пуркалади | 30                                                 |
| Олма      | Ун шудринг, парша                 | 0,7               |                                       | 30                                                 |
| Ўрик      | Клястероспориоз                   | 0,3               |                                       | 30                                                 |
| Гилос     | Клястероспориоз, коккомикоз       | 0,35              |                                       | 30                                                 |
| Бугдой    | Сариқ занг, ун шудринг, септориоз | 0,3               |                                       | 30                                                 |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Замбуруғ касалликлари профилактикаси ва касалликни даволаш учун ишлатилади;
- Касалликлардан ички ва ташқи мукамал ҳимоя;
- Замбуруғ касалликларининг барча босқичларида юқори самарали;
- Талаб этилган меъёрларда ишлатиш, атроф-муҳит учун ҳавфсиз.

# MONTOSOL

## 10% EC

Юқори самарага эга  
контакт ва тизимли фунгицид!



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Пенконазол 100г/л   |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрат |
| Кимёвий гуруҳ:         | Триазол             |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф          |

**Монтозол 10% эм.к.**,-химоялаш ва даволаш таъсирига эга тизимли фунгицид ҳисобланади. Баргларга тез сингувчан бўлиб, турли экинлардаги касалликларни самарали даволаш учун акропетал транслокация хусусиятига эга.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Касаллик тури      | Сарф меъёри (л/га) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Помидор, қалампир        | Ун шудринг         | 0,5-0,7            |
| Бодринг, қовун           | Ун шудринг         | 0,5-0,7            |
| Ток, олма, ўрик, шафтоли | Ун шудринг, оидиум | 0,2-0,25           |
| Манзарали ўсимликлар     | Ун шудринг, занг   | 0,25-0,4           |
| Нўхат, ловия             | Ун шудринг, занг   | 0,5-0,6            |

**Илова:** \* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Ишлов беришлар сонининг қисқариши, қўллаш муддатларининг мослашувчанлиги;
- Ўсимликга тез сингувчан ва препаратнинг ёмғирда ювилиб кетиш хавфини камайтиради;
- Айниқса, бирламчи инфекцияни бартараф этишда ҳақиқий ун шудринг қўзғатувчиларига қарши юқори самарадорли;
- Ток касалликларига қарши №1 рақамли фунгицид;
- Сарфлаш меъёрининг камлиги;
- Узоқ давом этувчи таъсир;
- Тизимли фаоллик ўсимликнинг касалликка чалинган барча қисмларини ҳимоя қилиш имконини беради.

фунгицид

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia

# Nuvo

72.2%

Ҳимоялаш таъсирига эга  
тизимли фунгицид!



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Пропамокارب гидрохлорид 722 г/л |
| Препарат шакли:        | Сувда эрувчи концентрат         |
| Кимёвий гуруҳ:         | Карбамат                        |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                      |

**Нуво 72.2% с.э.к.**, - бу ҳимоялаш таъсирига эга тизимли фунгицид. Илдиз ва барглارга тез сингиб, акропетал тарзда қўтарилади. Сабзавотлар ва манзарали ўсимликларнинг тупроқ ости қисмлари ва барг касалликларини назорат қилиш учун қўлланилади. Шунингдек, турли йўналишдаги тизимли таъсирга ва ўстириш стимулятори хусусиятига эга бўлган алоҳида тизимли, даволовчи ва ҳимоя қилувчи фунгицид.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                      | Касаллик тури                           | Сарф меъёри (л/га)                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бодринг*<br>(иссиқхоналардаги) | Ун шудринг, илдиз чириши<br>ва қора оёқ | 1,0-1,2                                                                                                          |
| Помидор*<br>(иссиқхоналардаги) | Фитофтороз, ун шудринг                  | 1,0-1,2                                                                                                          |
| Картошка                       | Фитофтороз                              | 1,0-1,2                                                                                                          |
| Манзарали ўсимликлар           | Илдиз чириши, фитофтороз                | 25 мл/10 л сувга<br>(уруғларга ишлов<br>берилади) 5-15 мл/10 л<br>сув (5-8 л/м <sup>3</sup> )<br>(пайвандигилар) |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Универсал, самарали ва хавфсиз;
- Оригинал таъсир қилувчи моддага эга тизимли фунгицид;
- Ўсимликларни (ўсимликларнинг остки ва ер устки қисмини) ўстирувчи фаол стимулятор;
- Сифатли ва соғлом қўчатларни етиштиришда муҳим фунгицид.

фунгицид

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia



# DUFARON

**40% ем.к**

*Замбуруғ касалликларга  
қарши юқори самарага эга  
тизимли фунгицид!*



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Пропиконазол 200 г/л +<br>Тебуконазол 200 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати                          |
| Кимёвий гуруҳ:         | Триазол                                       |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                                    |

**Дуфарон 40% ем.к.**, препарати барглар ва поялари орқали ўсимликларга киради, акропетал ҳаракат қилади. Замбуруғнинг вегетатив органларига таъсир кўрсатади ҳамда хужайра мембраналарининг ўтказувчанлигини тартибга солиш учун масъул бўлган эргостеролнинг (кўплаб замуруғларнинг асосий стероид бирикмаси) биосинтезини сусайтиради.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури       | Зараркунанда тури                                                     | Сарф-меъёр<br>л/га | Қд* | Нм** |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|
| Кузги<br>бугдой | Сариқ занг, қўнғир занг, ун-<br>шудринг, сариқ доғланиш,<br>септориоз | 0,2                | 40  | 1-2  |

*Илова:\** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Замбуруғ касалликлари профилактикаси ва касалликни даволаш учун ишлатилади;
- Касалликлардан ички ва ташқи мукаммал химоя;
- Препаратнинг коллоид нано-формуляцияси туфайли ўсимликка энг тез кириб бориш хусусиятига эга;
- 40 кунгача узоқ муддатли химоя таъсирини давом этиради;
- Қурғоқчилик шароитида ҳам "яшил" баргнинг ассимиляция фаоллигини узайтиради;
- Олинган ҳосилда хавфли микотоксинларнинг тўпланишини олдини олади.



# MANCOZEB GOLD 72 % NK

Йиллар давомиди, ишончли  
фунгицид эканлиги ўз исботини  
топган!



|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Манкозеб 640 г/кг+Цимоксанил 80г/кг. |
| Препарат шакли:        | Намланувчи кукун                     |
| Кимёвий гуруҳ:         | Дитиокарбамат ва Фениламид           |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                           |

**Манкозеб замбуруғ** касалликларига қарши контакт таъсир қилади. Цимоксанил моддаси ҳам контакт, ҳам тизимли таъсир қилиш хусусиятига эга.

**Манкозеб Голд 72% н.кук.,-** ўсимликларда учрайдиган сохта ун-шудринг, фитофториоз, пероноспороз, милдью, фузариоз ва альтернариоз замбуруғ касалликларига қарши юқори самарага эга.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Зарарли организмлар        | Сарф меъёри (кг/га) | Қўллаш бўйича тавсиялар             |
|-----------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Ток*      | Милдью                     | 2,0-2,5             | Ўсимликларни ўсув даврида пуркалади |
| Картошка* | Фитофтороз, альтернариоз   | 1,5-2,5             |                                     |
| Пиёз*     | Пероноспороз               | 1,5-2,0             |                                     |
| Помидор*  | Фитофтороз, кул ранг чириш | 1,5-2,5             |                                     |
| Бодринг*  | Ун шудринг                 | 1,5-2,0             |                                     |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган

\*Кд (кутиш даври): ҳосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, кун.

\*\*Нм (неча марта): бир мавсумда кўпи билан неча марта ишлатилади.

## Афзалликлари:

- Замбуруғ касалликлари профилактикаси ва касалликни даволаш учун ишлатилади;
- Касалликлардан ички ва ташқи мукаммал химоя;
- Замбуруғ касалликларини барча босқичларида юқори самарали;
- Ўсимликларни касалликлардан, илдизидан баргигача химоя қилади;
- Тавсия этилган меъёрларда ишлатиш, атроф-муҳит учун хавфсиз.

# AGRO NOMINI 40% SUS.K.

Шоли экилган майдонларни  
бегона ўтлардан самарали  
ҳимоя қилувчи гербицид!



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Биспирибак натрий 400 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати      |
| Кимёвий гуруҳлари:     | Пиримидилоксиб            |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                |

Агрономини 40% эм.к., - бу гербицид иримидинилоксибензоат кимёвий гуруҳига киради, таъсир қилиш механизмига кўра бу гербицид HRAC В гурузига мансуб. Ацетолактат синтаза синтезининг ингибатори. Бу баргнинг олд ва таг қисмидан тизимли равишда таъсир этади.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Сарфлаш меъёри<br>(л/га) | Қўллаш вақти бўйича тавсиялар          |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Шоли*     | 0,08-0,1+ПАВ 0,08-0,1    | Бир ва қўп йиллик бошоқли бегона ўтлар |

**Илова:** Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

1. \*\*Қд (Қутиш даври): Хосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, Кун.

2. \*\*\*Нм (Неча марта): Бир мавсумда қўпи билан марта ишлов берилади.

3. Қўллаш усули: Ўсимликлар ўсув даврида пуркалади.

## Афзалликлари:

- Бегона ўтларга қўллаш учун бир маротаб ишлов бериш етарли.
- Кам токсикологик одамларга ва атроф мухит учун хавсиз.
- Бошқа турдаги гербицидлар билан қўллаш мумкин.
- Ишловдан кейин бегона ўтларга таъсири 3-5 кун ўтгач кўринади.
- 14-20 кунда буткул таъсир курсатади.

# Evito plus 50% EC

Бир ва кўп йиллик бошоқли  
бегона ўтларга қарши, танлаб  
таъсир этувчи гербицид!



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Пендименталин 500 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати  |
| Кимёвий гуруҳлари:     | Динитроанилин         |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф            |

Пендиметалин хужайраларда ўтказувчи бўғимлар ҳосил бўлишини бузади ва бу орқали хужайралар бўлинишини тўхтатади.

Evito Plus 50% эм.к. бегона ўтларнинг илдизлари ва калоптель орқали таъсир қилади. Ишлов берилган майдонларда бегона ўтларнинг уруғлари ўсиб бошлаганидан кейин ёки майса тупроқ юзасига чиққанидан кейин тезда нобуд бўлади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури      | Сарфлаш меъёри (л/га) | Қўллаш вақти бўйича тавсиялар                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Картошка*      | 2,5-3,0               | Ўсиб чиқишдан бир ҳавта олдин                                                                                                                                                         |
| Пиёз*          | 2,5-3,0               | Униб чиқишдан олдин: (уруғлар 3 см чуқурликда) экилгандан кейин 4 кун давомида                                                                                                        |
| Сабзи*         | 2,5-3,0               | Экин қўқариб чиқишигача                                                                                                                                                               |
| Бугдой ва арпа | 2,5                   | Оғир тупроқлар учун: униб чиқишдан олдин ишлов берган маъқул. Енгил тупроқлар учун: бевосита униб чиққанидан кейин (бегона ўтлар 1,5-2 та баргли, поялари 3-5 см босқичида бўлганида) |
| Беда           | 2,0-2,5               | Униб чиққанидан кейин 3-барг босқичида ҳамда ўриб олингандан кейин                                                                                                                    |
| Саримсоқ, пиёз | 2,5-3,0               | Уруғ ва қўчатлар экишдан аввал тупроқ юзасига пуркалади                                                                                                                               |
| Ғўза           | 0,75-0,8              | Бир йиллик бошоқли ва икки паллали бегона ўтларга қарши. Чигит экиш билан бирга ёки экиб бўлингандан сўнг тупроқ юзасига тасма усулида пуркалади.                                     |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Тупроққа аралаштиришни ва қаторлар орасига механик ишлов беришни талаб этмайди;
- Экинларнинг қўпчилиги учун универсал гербицид;
- Тупроқ гербицидлари орасида кенг таъсир доирасига эга;
- 50 дан ортиқ маданий экинларда бегона ўтларга қарши ишлатилади;
- 30 дан ортиқ бир йиллик, бир паллали ва икки паллали бегона ўтларга юқори самарали.

Изохлар:

- Оғир тупроқларда ёки таркибида органик моддалар миқдори юқори бўлган тупроқларда юқори сарф меъёрларини қўлланг;
- Енгил тупроқларда пастроқ сарф меъёрларини қўлланг.

Ишлаб чиқарувчи:  
Montajat Pharmaceuticals Co.Ltd.  
Dammam - Saudi Arabia

# Agrozellek

## 10,4 % em.k.

*Бир ва қўп йиллик бошоқли  
бегона ўтларга қарши, танлаб  
таъсир этувчи гербицид!*



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Галаксифоп-R-метил 104 г/л |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати       |
| Кимёвий гуруҳлари:     | Арилоксифенокси-пропионат  |
| Заҳарлилик даражаси:   | III - синф                 |

**Агрозеллек 10,4 % эм.к.,** мой кислоталари синтезининг тўхтатувчисидир. У бошоқли бегона ўтларнинг барглари, илдизи, илдизпоялари ва поялари орқали сўрилади ва галоксифоп ўсиш нуқтасига ўтиб, меристема тўқималари ўсишини тўхтатиши орқали бегона ўтларни нобуд қилади.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Бегона ўт тури                                | Сарф-меъёри, л/га | Қўллаш бўйича тавсиялар                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ўза*      | Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтлар | 1,0               | Ўсувчи бегона ўтлар бўйи 10-15 см бўлганда ёппасига пуркалади |
| Пиёз      |                                               | 1,0               |                                                               |
| Сабзи     |                                               | 1,0               |                                                               |
| Кўкатлар  |                                               | 1,0               |                                                               |
| Ерэнғоқ   |                                               | 1,0               |                                                               |

Илова:\* Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

## Афзалликлари:

- Агрозеллек 10,4 % эм.к., гербициди билан ишлов берилганда фаол ўсаётган бегона ўтлар ўсишдан тўхтайди;
- Ҳаво хароратига боғлиқ равишда 10-12 кун бегона ўтлар ўсув нуқталари қорайиб, қизғиш-бинафша тусга киради;
- Агрозеллек 10,4 % эм.к., ўза, сабзи, пиёз, ерэнғоқ, мош, қовун, тарвуз, экинларида бир йиллик - сули, шамак, тулкиқуйруқ турлари, супурги ўт, райграс турлари, итқўноқ ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга (АЖРИҚ, ҒУМАЙ, ҚАМИШ) буғдойиқ турларига қарши қўлланиладиган гербицид.



# TOP OBGURON EKSTRA 54% эм.к.

Юқори самарали  
Дефолиант



|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Таъсир этувчи моддаси: | Tidiazuron 360 g/L + Diuron 180 g/L        |
| Препарат шакли:        | Эмульсия концентрати                       |
| Кимёвий гурухлари:     | Тидиазурон фенилмочевин диурон мочевинонат |
| Заҳарлилик даражаси:   | IV - синф                                  |

Топобгурон экстра 54% эм.к., -Тидиазурон Фенилмочевиналар кимёвий синфига, диурон эса мочевинолар кимёвий синфига киради. Препаратнинг таъсир кучи ишловдан 2-4 кунда куринади. Препарат хужайралар қаватларининг ажралишини фаоллаштиради. Натижада барглار қуримасдан яшил холида тўкилади. Шоҳларда қуриган шоҳлар қолиб кетмайди, бу эса тола сифатини тушиб кетишига олиб келмайди.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури | Ишлатилиши | Сарфлаш<br>меъёри (л/га) | Им**                                       | Нм*** |
|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Ўза*      | Дефолатция | 0.2                      | Қўсақларнинг 40-45%<br>очилганда пуркалади | 1     |

Илова: Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган.

1. \*\*Қд (Қутиш даври): Хосилни йиғишга қанча қолганда ишлов тугалланади, Қун.

2. \*\*\*Нм (Неча марта): Бир мавсумда қўли билан марта ишлов берилади.

3. Қўллаш усули: Ўсимликлар ўсув даврида пуркалади.

## Афзалликлари:

- Юқори сифатли дефолиант пахтани машинада теришни қулайлаштиради.
- Барглари қайта ўсиб кетишини олдини олади.
- Қўсақларнинг табиий етилиши ва очилишини тезлаштиради.
- 12 соат давомида ичдан таъсир эта бошлайди, таъсири 2-4 кунда сезилади.

ГЕРБИЦИД

Ишлаб чиқарувчи:  
AGRODAN CHEMICALS CO.LTD



TOP AGRO TRADE

# Green Gold

10 10 40+MЭ

10 5 40+MЭ+MgO



Озуқа шакли:

Кукун ҳолида (кук.)



## Қўллаш муддати

Green Gold 10 10 40+MЭ ва Green Gold 10 5 40+MЭ+MgO ўсимликларнинг гулдан сўнг то мевалар пишиб етилгунга қадар, калий, магний ва микроэлементлар етишмаслиги кузатилган вақтларда, шунингдек ҳосил сифати ҳамда ҳосилдорликни ошириш учун ишлатилади.

\*Бугдойда дастлабки ишлов гуллашдан бир ҳафта аввал ва кейинги ишловлар гуллашидан сўнг ҳамда мутахассис маслаҳатига кўра калий етишмаган ҳолатларда ишлатилади. \*Ўзада дастлабки ишлов гуллашдан аввал кейинги ишловлар кўсақлар етилгунга қадар ишлатиш тавсия қилинади ва/ёки мутахассис маслаҳатига кўра қўлланади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Сарф-меъёри            |                                        | Кутилган натижа                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Суспензия шаклда кг/га | Томчилатиш тизими орқали 1000 л. сувга |                                                                                                                                                                        |
| Ўза                      | 1,5-3,5*               | 2,5-3,0*                               | Ўсимликлар калий ва магний микроэлементлар етишмаслигининг олдини олиш, даволаш, ўсимликларнинг ривожланишини тезлатиш ва ҳосил сифатини яхшилаб ҳосилдорликни ошириш. |
| Бугдой                   | 1,5-3,0*               | -                                      |                                                                                                                                                                        |
| Данакли мева дарахтларда | 2,0-4,0*               | 3,0-4,5*                               |                                                                                                                                                                        |
| Маккажўхори              | 1,5-3,0*               | 2,0-3,0*                               |                                                                                                                                                                        |
| Қовун, тарвуз            | 2,0-3,0*               | 2,0-3,5*                               |                                                                                                                                                                        |

**Илова:\*** Озуқани қўллаш сарф-меъёрлари экин ёши, ўсув фазаси, озуқага бўлган талаб ва мутахассис маслаҳатига кўра танлаб олинади.

## Ишлатиш усуллари

### Эслатма:

- Суспензия шаклида озиклантиришда ишчи суюқлик сарфи ерда юрвучи пуркаш мосламалари учун (сув) 300 л., учувчисиз учиш мосламалари ва авиа пуркаш мосламалари учун ишчи суюқлик сарфи (сув) 50-100 л;
- Барча ишловлар ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари билан биргаликда ишлатиш мумкин.







TOP AGRO TRADE

# Green Gold

18 18 18+MЭ

18 18 18+MЭ+2Mg



Озуқа шакли:

Кукун холида (кук.)



## Қўллаш муддати

Green Gold 18 18 18+MЭ ва Green Gold 18 18 18+MЭ+2Mg ўсимликларда (чин барг ва тублаш фазасида) азот, фосфор, калий ва магний етишмаслиги натижасида ўсимликнинг ривожланиши кескин пасайиши, ўсимлик баргларида турли ранг ва шакл ўзгаришлари кузатилганда ҳамда ҳосилдорликни ошириш учун ишлатилади.

\*Барг орқали суспензия шаклида қўл пуркагичлари, трактор ярим тиркамали шангли пуркагич, ОБХ 600, дрон пуркагичлари, авиа пуркаш мосламалари ёрдамида қўллаш мумкин;

\*Техника (ғўза, маккажўхори, помидор, боғ) экинларидан макро ва микроэлементлар етишмаслиги кузатилганда, томчилатиб суғориш тизими орқали берилади.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Сарф-меъёри            |                                        | Кутилган натижа                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Суспензия шаклда кг/га | Томчилатиш тизими орқали 1000 л. сувга |                                                                                                                                                               |
| Ўза                      | 2,0-3,0*               | 2,5-3,0*                               | Ўсимликлар NPK ва микроэлементлар етишмаслигининг олдини олиш, даволаш, ўсимликларнинг ривожланишини тезлатиш ва ҳосил сифатини яхшилаб ҳосилдорликни ошириш. |
| Бугдой                   | 1,5-3,0*               | -                                      |                                                                                                                                                               |
| Данакли мева дарахтларда | 2,5-4,5*               | 3,0-5,0*                               |                                                                                                                                                               |
| Маккажўхори              | 2,5-3,0*               | 2,5-3,0*                               |                                                                                                                                                               |
| Қовун, тарвуз            | 2,5-3,5*               | 3,0-4,0*                               |                                                                                                                                                               |

**Илова:**\* Озуқани қўллаш сарф-меъёрлари экин ёши, ўсув фазаси, озуқага бўлган талаб ва мутахассис маслаҳатига кўра танлаб олинади.

## Ишлатиш усуллари

### Эслатма:

- Суспензия шаклида озиклантиришда ишчи суюқлик сарфи ерда юривчи пуркаш мосламалари учун (сув) 300 л., учувчисиз учиш мосламалари ва авиа пуркаш мосламалари учун ишчи суюқлик сарфи (сув) 50-100 л.



TOP AGRO TRADE

# Green Gold

10 52 10+МЭ

10 40 10+МЭ

15 30 15+МЭ



Озуқа шакли:

Кукун ҳолида (кук.)



## Қўллаш муддати

Green Gold 10 52 10+МЭ., ўсимликларнинг дастлабки ўсув даврида ўсиш, ривожланишини тезлатиш ва илдиз тизимини кучайтириш ҳамда фосфор етишмаслигини бартараф этиш учун ишлатилади.

\*Бугдой ўсимлигининг дастлабки 10-15 см бўлганидан бошлаб то тублаш фазасигача ҳамда мутахассис маслахатига кўра фосфор етишмаган ҳолатларда ишлатилади;

\*Ёўза экинида чин барг фазасидан то гуллаш фазаси даврларида ишлатиш тавсия қилинади ва мутахассис маслахатига кўра қўлланади.

## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Сарф-меёри             |                                        | Кутилган натижа                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Суспензия шаклда кг/га | Томчилатиш тизими орқали 1000 л. сувга |                                                                                                                              |
| Ўза                      | 1,5-3,5*               | 2,5-3,0*                               | Ўсимликлар Р ва микроэлементлар етишмаслигининг олдини олиш, даволаш, ўсимликларнинг ривожланишини тезлатиш учун ишлатилади. |
| Бугдой                   | 1,5-2,5*               | -                                      |                                                                                                                              |
| Данакли мева дарахтларда | 2,0-4,5*               | 2,5-3,5*                               |                                                                                                                              |
| Маккажўхори              | 2,0-3,5*               | 1,5-3,0*                               |                                                                                                                              |
| Қовун, тарвуз            | 2,0-3,5*               | 2,5-3,0*                               |                                                                                                                              |

**Илова:**\* Озуқани қўллаш сарф-меёрилари экин ёши, ўсув фазаси, озуқага бўлган талаб ва мутахассис маслаҳатига қўра танлаб олинади.

## Ишлатиш усуллари

### Эслатма:

- Барг орқали суспензия шаклида қўллаш учун барча турдаги пуркагичлардан фойдаланиш мумкин;
- Суспензия шаклида озиклантиришда ишчи суюклик ерда юрувчи пуркаш мосламалари учун (сув) 300 л., учувчисиз учиш мосламалари ва авиа пуркаш мосламалари учун ишчи суюклик сарфи (сув) 300 л.



TOP AGRO TRADE

# Green Gold

## 20 20 20+MЭ



Озуқа шакли:

Кукун ҳолида (кук.)



### Қўллаш муддати

Green Gold 20 20 20+MЭ., ўсимликларнинг барча ўсув фазаларида азот, фосфор, калий ва микроэлементлар етишмаслиги кузатилган вақтларда, шунингдек ҳосил сифати ҳамда ҳосилдорликни ошириш учун ишлатилади.

\*Барг орқали суспензия шаклида қўллашда барча турдаги пуркагичларда фойдаланиш мумкин. \*Буғдой экиннинг тублаш фазасидан бошлаб то сут-қатик-мўм-пишиш фазаларида касаллик ва ҳашоратларга қарши қўлланувчи пестицидлар билан биргаликда ишлатиш мумкин.

\*Ёўза экинида чин барг фазасидан бошлаб кўсак етилгунга қадар ўргимчаккана, кўсак қурти, шира, трипс ва қандалаларга қарши қўлланувчи пестицидлар билан биргаликда ишлатиш мумкин.



## Фойдаланиш бўйича қўлланма:

| Экин тури                | Сарф-меъёри            |                                        | Кутилган натижа                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Суспензия шаклда кг/га | Томчилатиш тизими орқали 1000 л. сувга |                                                                                                                                                               |
| Ўза                      | 1,5-2,5*               | 2,0-3,0*                               | Ўсимликлар NPK ва микроэлементлар етишмаслигининг олдини олиш, даволаш, ўсимликларнинг ривожланишини тезлатиш ва ҳосил сифатини яхшилаб ҳосилдорликни ошириш. |
| Бугдой                   | 1,2-2,5*               | -                                      |                                                                                                                                                               |
| Данакли мева дарахтларда | 2,0-4,0*               | 3,0-4,5*                               |                                                                                                                                                               |
| Маккажўхори              | 2,0-3,0*               | 2,0-3,0*                               |                                                                                                                                                               |
| Қовун, тарвуз            | 2,0-3,0*               | 2,5-3,5*                               |                                                                                                                                                               |


**Илова:**\* Озуқани қўллаш сарф-меъёрлари экин ёши, ўсув фазаси, озуқага бўлган талаб ва мутахассис маслаҳатига кўра танлаб олинади.

## Ишлатиш усуллари

### Эслатма:

- Суспензия шаклида озиқлантиришда ишчи суюқлик сарфи ерда юрۇвчи пуркаш мосламалари учун (сув) 300 л., учувчисиз учиш мосламалари ва авиа пуркаш мосламалари учун ишчи суюқлик сарфи (сув) 50-100 л.





 Тошкент шаҳри, Сергели тумани  
Қумариқ кучаси 24а уй

 +998 (33) 704-80-00


+998 (99) 761-80-00

+998 (55) 502-80-00

 topagrotrade@mail.ru



**TOP AGRO TRADE**



 Тошкент шаҳри, Сергели тумани  
Қумариқ кучаси 24а уй

 +998 (33) 704-80-00

+998 (99) 761-80-00

+998 (55) 502-80-00

 topagrotrade@mail.ru



**TOP AGRO TRADE**